

Eesti täiskasvanud rahvastiku uimastite tarvitamise uuring,

2018



Tervise Arengu Instituut
National Institute for Health Development

Tervise Arengu Instituut

Eesti täiskasvanud rahvastiku uimastite tarvitamise uuring, 2018

Sigrīd Vorobjov, Maris Salekešin, Kaire Vals

Tallinn 2019

Soovime tänada järgmisi kolleege abi ja nõuannete eest: Kristi Rüütel, Liilia Lõhmus, Liis Lemsalu, Helvi Tarien ja Katri Abel-Ollo.

Väljaande andmete kasutamisel viidata allikale.

Soovitatav viide käesolevale väljaandele: Vorobjov, S, Salekešin, M, Vals K. Eesti täiskasvanud rahvastiku uimastite tarvitamise uuring. Tallinn: Tervise Arengu Instituut; 2019.

Sisukord

Kokkuvõte.....	4
Заключение	5
Summary	7
1. Sissejuhatus	8
2. Metoodika	9
3. Narkootiliste ainete kättesaadavus (tabelid 1–2).....	11
4. Narkootiliste ainete tarvitamine (tabelid 3–29)	12
5. Teiste uimastite tarvitamine	14
5.1 Suitsetamine ja tubakatooted (tabelid 30–32).....	14
5.2 Alkoholi tarvitamine (tabelid 33–36).....	15
5.3 Ravimite mittemeditsiiniline tarvitamine (tabelid 37–39)	16
5.4 Inhalandid (tabelid 40–41)	17
5.5 Uute psühhoaktiivsete ainete tarvitamine (tabelid 42–43)	17
5.6 Erinevate uimastite samaaegne tarvitamine (tabelid 44–45)	18
6. Tervises seisund	18
6.1 Füüsiline tervis ja uimastite tarvitamisega seotud terviseprobleemid (tabelid 46–54)	18
6.2 Vaimne tervis ja seos uimastite tarvitamisega (tabel 55)	19
7. Arvamused uimastitega seotud probleemidest, riskidest ja meetmetest	21
7.1 Uimastitega seotud probleemid (tabelid 56–60)	21
7.2 Sigarettide, alkoholi, narkootikumide ja anaboolsete steroidide tarvitamisega seotud risk tervisele (tabel 61).....	22
7.3 Uimastitega seotud seadusandlus (tabelid 62–64)	24
7.4 Teabeallikad narkootiliste ainete kohta (tabel 65).....	25
Kasutatud kirjandus.....	26
Tabelid	27

Kokkuvõte

Uuring annab ülevaate Eesti täiskasvanud elanike hoiakutest uimastite tarvitamise suhtes ning erinevate uimastite, sh narkootikumide, alkoholi ja tubakatoodete tarvitamise levikust. 5000-le juhuslikult valitud 16–64-aastasele Eesti elanikule saadeti posti teel küsimustikud, mis olid koostatud eesti ja vene keeles ning mida oli võimalik täita paberil või internetis vastates. Küsimustikule vastas 45% uuringu valimisse sattunutest.

Veerand (25%) Eesti täiskasvanud elanikest on tarvitanud elu jooksul mõnda narkootilist ainet, kusjuures 7% oli teinud seda viimasel aastal ja 3% viimasel kuul. Elu jooksul tarvitatud narkootilistest ainetest oli kõige sagedasem kanep. Lisaks märgiti sagedamini stimulantide (amfetamiini, ecstasy ja kokaiini) tarvitamist. Kui narkootikumide sh kanepi tarvitamist esines sagedamini alla 35-aastaste hulgas, meeste hulgas pisut sagedamini, siis noorimas vanuserühmas (16–24 aastat) meeste ja naiste vaheline erinevus puudus. Igal neljandal esines seoses narkootiliste ainete tarvitamisega probleeme kodus või paarisuhetes ning igal seitsmendal oli majanduslikke probleeme ja/või probleeme sõpradega. Terviseprobleeme seoses narkootikumide tarvitamisega esines alla 2% vastanutest.

20% vastajatest suitsetas iga päev või peaaegu iga päev. Igapäevasuitsetajaid oli kõige rohkem 45–64-aastaste meeste hulgas. Aeg-ajalt suitsetajaid oli enam 16–24-aastaste naiste hulgas.

AUDIT-C skoori põhjal esines kolmandikul probleemset alkoholi tarvitamist, ligi pooltel (45%) meestel ja pisut alla veerandi (23%) naistel. Nädalas kaks korda või sagedamini alkoholi tarvitanud tarvitasid alkoholi sagedamini suuremas koguses. Igal seitsmendal (14%) inimesel oli esinenud terviseprobleeme alkoholi tarvitamise tõttu, nendest kolmandikul viimase aasta jooksul.

14% vastanutest oli elu jooksul, sh 3% viimasel aastal, tarvitanud ravimeid mittemeditsiinilisel otstarbel, naised pisut sagedamini kui mehed. Kokku 4% vastas, et on kunagi tarvitanud inhalante joobe saavutamise eesmärgil. Uusi psühhoaktiivseid aineid oli tarvitanud 1% koguvalimist. Lisaks esines mitme uimasti koostarvitamist: 15% kõikidest vastanutest elu jooksul ja 5% viimase aasta jooksul oli tarvitanud samaaegselt mitut uimastit. Kõige sagedamini tarvitati samaaegselt alkoholi ja kanepit.

13% vastanutest esines depressiooni sümptomeid (MHI-5 skoori põhjal), naistel pisut sagedamini kui meestel (vastavalt 15% ja 10%). Võrreldes eri vanuserühmi, esines depressiooni sümptomeid kõige sagedamini noorimas vanuserühmas, 16–24-aastaste seas (18%). Nii alkoholi kui ka narkootiliste ainete tarvitamine oli seotud depressiooni sümptomite esinemise sagedusega.

Kaasinimeste uimastite tarvitamist peeti probleemiks nii Eestis üldiselt kui ka oma kodukohas. Alkoholi ja narkootikumide tarvitamist peeti Eesti ühiskonnas pigem võrdse kaaluga probleemideks. Ligi 40% vastas, et on tundnud hirmu kellegi teise uimastitarvitamise tõttu vägivalla ohvriks sattumise pärast.

Kui enamik inimesi pidas iga päev suitsetamist, vähemalt korra nädalas purju joomist, stimulantide ja anaboolsete steroidide paarikordset tarvitamist suureks või mõõdukaks riskiks tervisele, siis kanepi paarikordset tarvitamist pidas riskiks tervisele veidi üle poole vastanutest.

Заключение

Проведённое исследование даёт представление об отношении взрослого населения Эстонии к употреблению наркотических веществ и росту потребления таких средств как, например, наркотики, алкоголь и табак. Анкеты на эстонском и русском языках были отправлены по почте 5000 случайно выбранным жителям Эстонии в возрасте от 16 до 64 лет. Заполнить их можно было на бумаге или в Интернете. Анкеты заполнили 45% из попавших в выборку лиц.

Четверть (25%) взрослых жителей Эстонии употребляли некоторые наркотические вещества в течение жизни, причем 7 % опрошенных делали это в прошлом году, и 3% - в прошлом месяце. Самым распространенным наркотиком, который люди употребляли в течение жизни, была конопля. Также, многие отметили в анкете употребление стимуляторов (амфетамин, экстази и кокаин). Если употребление наркотиков, в том числе конопли, было более распространено среди лиц моложе 35 лет (при чем несколько чаще встречалось у мужчин), то разница показателей в самой молодой возрастной группе (от 16 до 24 лет) у мужчин и женщин отсутствовала. У каждого четвертого ответившего в связи с употреблением наркотиков возникали проблемы дома или в отношениях, а у каждого седьмого были экономические трудности и/или проблемы с друзьями. Проблемы со здоровьем в связи с употреблением наркотиков возникали менее, чем у 2%.

20% участников ежедневно или периодически курили. Больше всего ежедневно курящих было среди мужчин в возрасте от 45 до 64 лет. Периодические курильщики чаще встречались среди женщин в возрасте от 16 до 24 лет.

Согласно оценке AUDIT-C, у одной трети ответивших были проблемы с употреблением алкоголя: почти у половины (45 %) мужчин и у чуть менее четверти (23%) женщин. Лица, которые прибегали к употреблению алкоголя два раза в неделю или чаще, как правило употребляли его в больших количествах. У каждого седьмого человека (14 % опрошенных) были проблемы со здоровьем из-за употребления алкоголя, у трети из них - в прошлом году.

14% опрошенных в течение жизни употребляли лекарства в немедицинских целях, из них 3% - в прошлом году, причём женщины немного чаще, чем мужчины. В общей сложности 4% ответили, что когда-либо использовали ингалянты для достижения состояния опьянения. К новым психоактивным веществам прибегал 1% от общей выборки. Кроме того, употреблялись комбинации нескольких наркотических веществ: 15% всех участников в течение жизни и 5% в течение прошлого года принимали несколько препаратов одновременно. Чаще всего вместе использовались алкоголь и конопля.

У 13% наблюдались симптомы депрессии (по шкале МНН-5), причём у женщин несколько чаще, чем у мужчин (у 15% и у 10% соответственно). Среди различных возрастных групп наиболее часто симптомы депрессии встречались в самой молодой возрастной категории- от 16 до 24 лет (у 18% участников). Потребление алкоголя и наркотиков было связано с частотой проявления симптомов депрессии.

Употребление наркотиков близкими людьми было признано как обще-эстонской, так и локальной проблемой. Большинство посчитало потребление алкоголя и наркотиков равнозначными для эстонского общества проблемами. Почти 40% ответили, что они боятся пострадать от насилия со стороны лица, находящегося под воздействием наркотических средств.

Если большинство людей признало ежедневное курение, пьянство по меньшей мере один раз в неделю и неоднократное употребление стимуляторов и анаболических стероидов высоким

или умеренным риском для здоровья, то неоднократное употребление конопли признало риском для здоровья чуть более половины опрошенных.

Summary

The survey provides an overview of the attitudes of Estonian adult population towards drug use and the prevalence of various drug use, including besides drugs, also alcohol and tobacco products. Questionnaires prepared in Estonian and Russian, which could be filled out on paper or on the internet, were sent by mail to 5,000 randomly selected Estonian residents aged 16 to 64. Of those sampled, 45% replied to the questionnaire.

A quarter (25%) of Estonian adults have used some kind of drug during their lifetime, whereby 7% had done it within the past year and 3% within the past month. Cannabis was the most commonly used drug. In addition, the use of stimulants (e.g amphetamine, ecstasy and cocaine) was reported more frequently. While drug use, including cannabis use, was more common among people under the age of 35, more frequently among men, there was no difference between men and women in the youngest age group (16 to 24 years). Every fourth person had problems related to drug use at home or in their relationships, and every seventh had economic problems and/or problems with friends. Less than 2% reported health problems related to drug use.

20% of the respondents smoked daily or almost every day. The number of daily smokers was the highest among men aged 45 to 64. Occasional smoking was the most frequent among women aged 16 to 24 years.

Based on the AUDIT-C score, one-third had problematic alcohol use, nearly half (45%) of men and less than quarter (23%) of women. Those who consumed alcohol twice a week or more frequently tended to consume higher amounts of alcohol more often. Every seventh (14%) person had experienced health problems due to alcohol consumption, one third of them in the past year.

When it comes to consuming medications for non-medical purposes, 14% of the respondents had done it during their lifetime and 3% during the past year, women slightly more frequently than men. A total of 4% replied that they had used inhalants to achieve intoxication. 1% of the total sample had used new psychoactive substances. In addition, there were cases of simultaneous use of multiple drugs: 15% of all respondents in their lifetime and 5% in the past year had taken multiple drugs at the same time. Most often combined substances were alcohol and cannabis.

13% had symptoms of depression (based on MHI-5 score), women slightly more frequently than men (15% and 10%, respectively). Compared to different age groups, symptoms of depression were most common in the youngest age group of 16 to 24 years (18%). The use of both alcohol and drugs was related to the higher frequency of depression symptoms.

The use of drugs among fellow people was seen as a problem both in Estonia in general as well as close to one's community. The use of alcohol and use of drugs were considered to be equal problems in the Estonian society. Nearly 40% replied that they felt fear of being a victim of violence because of someone else's drug use.

While most people believed that daily smoking, getting drunk at least once a week, using stimulants and anabolic steroids a couple of times involved a high or moderate risk to health, a more than half of the respondents considered using cannabis for a few times to be a health risk.

1. Sissejuhatus

Kogumik annab ülevaate 16–64-aastaste Eesti elanike hoiakutest uimastite tarvitamise suhtes ning erinevate uimastite sh narkootikumide, alkoholi ja tubakatoodete tarvitamise levikust. Põgusalt on uuritud ka dopingainete tarvitamist. Eelmine uuring, mis käsitles põhjalikumalt Eesti täiskasvanud elanikkonna narkootikumide tarvitamist, toimus 2008. aastal „Töö, kodu ja vaba aeg“ uuringu raames (1). Üldisemaid küsimusi narkootikumide tarvitamise kohta, nt elu jooksul narkootikumide ja kanepi tarvitamine, on uuritud muu hulgas Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise (TKU) uuringutes (2,3). Nende põhjal on teada, et ligi 22% Eesti 16–64-aastastest elanikest on tarvitanud mõnda narkootilist ainet (2) ja 19% on tarvitanud kanepit vähemalt korra elu jooksul (3). Lisaks on narkootikumide tarvitamist teiste teemade hulgas käsitlenud Politsei- ja Piirivalveameti avaliku arvamuse ja riskikäitumise uuringutes, mille põhjal 17% Eesti 18–74-aastastest elanikest on tarvitanud elu jooksul mõnda narkootilist ainet (4). Võrreldes eri uuringute tulemusi on näha, et elanikkonnas on sagenenud narkootikumide tarvitamine ning vaja on põhjalikumaid ja järjepidevalt kogutavaid andmeid.

Selles raportis käsitletakse uimasteid kui psüühikat mõjutavaid aineid, mida inimene kasutab enda enesetunde mõjutamiseks oma äranägemise järgi. Eraldi peatükkidesse on jagatud narkootikumide ja teiste uimastite tarvitamine. Narkootikumide peatükis käsitletakse ainete tarvitamist, mis kuuluvad narkootiliste ja psühhotroopsete ainete nimekirja ja mis on n-ö keelatud ained. Teiste uimastite peatüki all kirjeldatakse eraldi alapeatükkides alkoholi ja tubaka tarvitamist, mis on n-ö lubatud ained, kuid keelatud Eestis alla 18-aastastele. Lisaks käsitletakse inhalantide tarvitamist, mille müük pole küll piiratud, kuid mille eesmärgipärane kasutusotstarve on muu kui psüühika mõjutamine. Uuteks psühhoaktiivseteks aineteks loetakse ained, mis võivad olla narkootikumile ehk keelatud ainele sarnase toimega, kuid mille puhul see aine ehk keemiline ühend ei pruugi veel kuuluda keelatud ainete nimekirja. Sarnaselt käsitletakse psüühikat mõjutavaid ravimeid (nt rahustid, uinutid või opiaatsed valuvaigistid), mille tarvitamise üle otsustab arst, määrates retsepti alusel ravimi. Samas kui inimene tarvitab ravimit ilma arsti ettekirjutuseta, suuremas koguses või teisel otstarbel, kui arst on määranud, siis peetakse seda ravimi mittemeditsiiniliseks tarvitamiseks ja seda on käsitletud eraldi alapeatükis teiste uimastite peatüki all.

Selle uuringu põhieesmärk oli koguda uimastite tarvitamisega seonduvat teavet Eesti 16–64-aastaste elanike hulgas. Uuritavad teemad olid narkootiliste ainete kättesaadavus, tarvitamine ja tarvitamisega seotud terviseriskid ning inimeste enesehinnang oma tervises seisundi ja füüsilise aktiivsuse kohta. Veel uuriti suhtumist uimastite tarvitamisse, seotud probleemidesse ja meetmetesse.

Antud uuring toimus 2018. aastal esimest korda. Edaspidi on plaanis uuringu järjepidev korraldamine iga nelja aasta järel, eesmärgiga moodustada ühtne ja pidevalt täienev andmebaas, et analüüsida võimalikke muutusi rahvastiku käitumises. Perioodiliselt kogutavad andmed loovad teaduspõhise aluse Eesti rahvastiku tervislike eluviiside kujundamisele, haiguste ennetamisele ja tervise arengukavade koostamisele ning võimaldavad võrrelda Eesti andmeid teiste riikide omadega.

2. Metoodika

Eesti täiskasvanud elanikkonna uimastite tarvitamise uuringu andmete kogumiseks telliti valim rahvastikuregistrist. Valimi moodustamiseks kihitati isikud soo, vanuse (16–24, 25–34, 35–44, 45–54, 55–64) ning elupiirkonna järgi (vastavalt NUTS3: Kesk-Eesti, Kirde-Eesti, Lõuna-Eesti, Lääne-Eesti ja Põhja-Eesti).

Andmeid koguti 2018. aasta veebruarist kuni juuni lõpuni. Küsimustikud (lisaks kaks meeldetuletuskirja, kui uuritav ei olnud vastanud teatud aja möödudes) koos uuringut tutvustava kaaskirjaga saadeti 5000-le juhuslikult valitud 16–64-aastasele Eesti elanikule rahvastikuregistrist saadud posti- ja e-posti aadressile. Küsimustikud olid koostatud eesti ja vene keeles. Rahvastikuregistrisse märgitud emakeele alusel saadeti inimesele eesti- või venekeelne küsimustik. Küsimustikule oli võimalik vastata nii paberil kui ka interneti teel. Uuritavatele saadetud kaaskiri sisaldas internetiaadressi ja uuringukoodi, mida sisestades sai Tervise Arengu Instituudi kodulehe kaudu täita küsimustikku LimeSurvey keskkonnas, valides eelnevalt küsimustiku täitmiseks sobiva keele.

Paberil täidetud ja posti teel tagasi saadetud küsimustikud sisestati EpiData programmi abil, mis sisaldas loogilisi kontrole, et vähendada sisestusvigu. Seejärel ühendati käsitsi sisestatud andmed interneti teel täidetud küsimustiku andmebaasiga ning kontrolliti uuringukoodi topeltesinemist, sest uuritav võis vastata nii paberil kui ka internetis. Topeltuuringukoodi (n=21) puhul jäeti andmebaasi elektrooniliselt täidetud küsimustik, eeldades, et inimene on andmed sisestanud ja seega puuduvad võimalikud sisestusvead.

69-l juhul saadi teavet uuringus mitteosalemise kohta. Sagedasemad põhjused olid, et inimene ei ela Eestis (n=32), ei ela rahvastikuregistrist saadud aadressil (n=13), ei saanud täita tervisega seotud põhjustel (n=12), soovis ingliskeelset ankeeti (n=7). Lõplikuks vastamismääraks jäi 45% (n=2234).

Tabelis on esitatud Eesti rahvastiku ja vastajate osakaalud vanuse ja soo järgi. Rahvastikuga võrreldes (seisuga 01.01.2017) oli vastajate hulgas 20–29-aastaste meeste osatähtsus mõnevõrra väiksem ja 60–64-aastaste meeste osatähtsus pisut suurem.

Tabel. Vanuserühmade jaotus soo järgi (%) 16–64-aastaste Eesti elanike ja vastajate põhjal

Mehed							
	Vanuserühm						Kokku
	16–19	20–29	30–39	40–49	50–59	60–64	
Eesti rahvastik	5,9	20,0	23,5	22,0	19,7	8,9	100,0
Vastajad	6,6	16,5	22,7	20,7	21,3	12,1	100,0
Naised							
	Vanuserühm						Kokku
	16–19	20–29	30–39	40–49	50–59	60–64	
Eesti rahvastik	5,5	18,5	21,8	21,4	21,6	11,3	100,0
Vastajad	4,8	18,5	20,2	21,8	22,1	12,6	100,0

Raport on jagatud kaheks osaks. Kõigepealt on esitatud peamised tulemused koos tõlgendustega ja seejärel tabelid, mille põhjal saab üksikasjalikuma ülevaate arvulistest väärtustest. Selleks et võrrelda narkootikumide tarvitamisega seotud tunnuseid ajaliselt, kasutati aastatel 1993–2008 läbi viidud „Töö, kodu ja vaba aeg“ uuringute ja TKU 2016 andmeid, kui oli kasutatud ühesuguse sõnastusega

küsimusi. Andmete täielikku võrreldavust piirab valimisse kaasatud uuritavate vanus, aastatel 1993–1998 kuulusid valimisse 18–70-aastased, aastatel 2003–2008 aga 16–69-aastased. TKU valimisse kaasati selles uuringus samas vanusevahemikus, 16–64-aastased uuritavad.

Andmete kirjeldamiseks on kasutatud absoluutset (n) ja suhtelist sagedust (%). Protsentidevahelise erinevuse statistilise olulisuse hindamiseks kasutati hii-ruut testi ja t-testi. Andmetöötlemiseks kasutati statistikaprogrammi Stata 13.


Uuringu läbiviimiseks on saadud luba Tallinna Meditsiiniuuringute Eetikakomiteelt.

3. Narkootiliste ainete kättesaadavus (tabelid 1–2)

Narkootikumide tarvitamine on tundlik teema ja parema ülevaate saamiseks kasutatakse erinevaid kaudsemaid küsimusi. Sageli küsitakse narkootikumidega seonduva olukorra hindamiseks narkootikumidega kokkupuute kohta, nt kui paljud tunnevad isiklikult narkootikumi tarvitajaid või kui paljudele on pakutud tarvitamiseks narkootilisi aineid.

Enam kui kolmandik (36%) uuringus osalenust tundis isiklikult kedagi, kes tarvitab narkootikume, ja ligi veerand (23%) oli neid, kellele oli kunagi elu jooksul pakutud tasuta või osta narkootilisi aineid. Võrreldes „Töö, kodu ja vaba aeg 2008“ uuringuga, on kümne aasta tagused tulemused sarnased praeguse uuringuga, kolmandikul inimestest oli tuttav, kes tarvitab või on tarvitanud narkootikume, ning 24%-le vastanutest oli pakutud narkootikume.

Uuringu käigus selgus, et inimestest, kellele oli Eestis pakutud narkootikume, pakuti viimase aasta jooksul 40%-le neid tasuta ja 28%-le raha eest. Oluliselt rohkem oli pakutud narkootikume noorematele inimestele (joonis 1). Ligi kümnendikule oli pakutud narkootikume tasuta või raha eest kolm või enam korda viimase aasta jooksul.



Joonis 1. Kokkupuude narkootikumide pakkumisega vanuserühmade alusel viimase 12 kuu jooksul Eestis


Vastajatel paluti hinnata erinevate narkootiliste ainete kättesaadavust. Kõige kergemini kättesaadavaks aineks peeti kanepit. 38% vastas, et kui neil tekiks soov kanepit saada, oleks seda kerge teha. Samas ei osanud ligi pooled (48%) hinnata kanepi kättesaadavust. Rahustite/uinutite kättesaadavust ilma arsti korralduseta pidas kergeks 18% inimestest. Stimulantide kättesaadavust hinnati sarnaselt: amfetamiini ja *ecstasy*'t pidas kergesti kättesaadavaks 16% ning kokaiini pidas kergesti kättesaadavaks 12% inimestest. Pisut üle 60% oli neid, kes ei osanud vastata stimulantide kättesaadavuse kohta. Lisaks küsiti dopingainete kättesaadavuse kohta. Üldjuhul ei osanud üle poole seda hinnata, ligi kümnendik pidas neid kergesti kättesaadavaks. Eri ainete kättesaadavuse hinnangud meeste ja naiste vahel palju ei erinenud. Oluliselt sagedamini pidasid narkootilisi aineid kergesti kättesaadavaks 16–24-aastased.

Kui narkootiliste ainete tarvitamine ei oleks seadusevastane, siis prooviks kanepit 22% ning amfetamiini või kokaiini 5% inimestest. Narkootilisi aineid prooviks/tarvitaks sagedamini mehed võrreldes naistega ning nooremad vastajad võrreldes teiste vanuserühmadega.

4. Narkootiliste ainete tarvitamine (tabelid 3–29)


Narkootikumide tarvitamise kirjeldamiseks eristatakse kolme tunnust: elu jooksul (eluaegne levimusmäär), viimase 12 kuu (ühe aasta levimusmäär) ja 30 päeva (ühe kuu levimusmäär) jooksul tarvitamine (5). Elu jooksul tarvitamine kirjeldab valdavalt üks või kaks korda narkootilise aine proovimist/tarvitamist. Viimase aasta ja viimase kuu jooksul tarvitamine iseloomustab rohkem korduvat tarvitamist ehk n-ö aktiivseid tarvitajaid, kuigi need arvud hõlmavad ka narkootikumidega katsetajad ja nende proovijad.

Uuringu põhjal on veerand (25%) Eesti täiskasvanud elanikest tarvitanud enda sõnul mõnda narkootilist ainet elu jooksul, 7% viimasel aastal ja 3% viimasel kuul. Narkootikumide tarvitamist esines enam meeste kui naiste hulgas. Kui 25–45-aastaste hulgas on narkootikumide tarvitamises selged soolised erinevused, siis noorimas 16–24-aastaste vanuserühmas meeste ja naiste vaheline erinevus puudub (joonis 2). Korduvat tarvitamist kirjeldavad levimusmäärad olid kõrgeimad noorimas vanusrühmas.



Joonis 2. Narkootiliste ainete tarvitamine elu jooksul, viimase aastal ja viimasel kuul soo ja vanuse järgi

Kui võrrelda trendi varasemaid rahvastiku uuringuid arvestades, on igal uuringuaastal kasvanud elu jooksul narkootilisi aineid tarvitanute osakaal (joonis 3).




Joonis 3. Elu jooksul narkootilisi aineid tarvitanud Eesti täiskasvanud elanike osakaal eri uuringute ja aastate põhjal

*1993–2008 „Töö, kodu ja vaba aeg“ uuring, aastatel 1993–1998 valimis 18–70-aastased, aastatel 2003–2008 valimis 16–69-aastased

**TKU 2015, valimis 16–64-aastased

Elu jooksul tarvitatud narkootilistest ainetest oli kõige sagedasem kanep. Lisaks märgiti, et võrreldes muude narkootiliste ainetega tarvitati sagedamini stimulante, nagu amfetamiin, *ecstasy* ja kokaiin (joonis 4). N-ö tugevatoimeliste narkootikumide, nt opioidide (sh fentanüül, heroiin) levimus üldelanikkonnas võib olla alahinnatud, sest posti teel saadetud küsimustik ei jõua inimeseni, kes ei oma püsivat elukohta või kellel puudub alalise elukoha aadress, kuid selliste inimeste hulgas on sagedamini tugevatoimeliste narkootiliste ainete tarvitajaid.




Joonis 4. Elu jooksul tarvitatud narkootiliste ainete osakaal, %

*mittemeditsiinilisel eesmärgil

Kui vaadata eraldi kanepi tarvitamist, võib öelda, et seda esines meeste ja nooremate vastajate hulgas sagedamini (joonis 5). Erandiks oli noorim vanuserühm, kus sooline erinevus peaaegu puudus

ja 16–24-aastaste naiste hulgas oli kanepit tarvitanud peaaegu sama palju inimesi kui meeste hulgas. Samuti esines noorimas vanuserühmas sagedamini korduvat kanepi tarvitamist.



Joonis 5. Kanepi tarvitamine elu jooksul, viimase aastal ja viimasel kuul soo ja vanuse järgi

Viimasel aastal kanepit tarvitanutest 28% tarvitas kanepit 1–2 korda aastas, 36% 3–10 korda ja ülejäänud kord kuus või sagedamini. Ligi kolmveerand (71%) tarvitas kanepit peamiselt meelelahutuslikul eesmärgil, kuid 29% oli neid, kes tarvitas kanepit nii meelelahutuslikul kui ka ravi eesmärgil. Suur osa oli enda sõnul viimase 12 kuu jooksul saanud kanepit kellegi käest tasuta (viimasel aastal kanepit tarvitanutest sai 55% alati tasuta ja 35% mõnikord) ning vähem oli ise ostnud (viimasel aastal kanepit tarvitanutest ostis 43% alati ja 25% mõnikord).


Elu jooksul mõnda narkootilist ainet tarvitanutest on enamus (97%) tarvitanud kanepit. Seetõttu sarnanevad narkootiliste ainete tarvitamist üldiselt kirjeldavad näitajad kanepi tarvitamise näitajatega. Samas tuleb märkida, et paljudele jääb kanepi tarvitamine/ proovimine ainukeseks kogemuseks narkootiliste ainete katsetamisel.

Narkootikumide tarvitamine on seotud mitmete probleemidega. Viimase kuu jooksul narkootilisi aineid tarvitanutel esines enda narkootikumide tarvitamise tõttu probleeme kõige sagedamini kodus või paarisuhtes (26%). Lisaks mainiti probleeme sõpradega (15%), majanduslikke probleeme (15%), probleeme politseiga (13%) ja probleeme tööl, koolis või ülikoolis (9%).

5. Teiste uimastite tarvitamine

5.1 Suitsetamine ja tubakatooted (tabelid 30–32)

Iga päev või peaaegu iga päev suitsetas 20% vastajatest, 6% oli aeg-ajalt suitsetajaid. Alla kolmandiku (29%) oli suitsetanud kunagi varem ja pisut vähem kui pooled (45%) ei olnud kunagi elu jooksul suitsetanud. Naiste hulgas oli rohkem mittesuitsetajaid kui meeste hulgas (joonis 6). Erandiks oli 16–24-aastaste vanuserühm, kus aeg-ajalt suitsetajaid oli naiste hulgas rohkem (15% võrreldes (edaspidi vs) 8%). Iga päev suitsetajaid oli kõige rohkem 45–64-aastaste meeste hulgas (joonis 6).




Joonis 6. Sigarettide suitsetamine soo ja vanuse järgi

Lisaks sigarettide suitsetamisele küsiti muude tubakatoodete tarvitamise kohta viimasel aastal. Elektroonilisi sigarette oli mõnikord tarvitanud 7% vastanutest ja 1% tarvitas neid iga päev. 4% oli viimase aasta jooksul tarvitanud huuletubakat ja iga päev tarvitas seda 1%. Viimase aasta jooksul oli 12% tarvitanud vesipiipu. Vesipiipu tarvitati enamasti mõnel korral aastas (11%). Muude tubakatoodete tarvitamine oli sagedasem meeste hulgas, võrreldes naistega, ning esines sagedamini noorimas vanuserühmas, 16–24-aastaste hulgas.

5.2 Alkoholi tarvitamine (tabelid 33–36)

Viimase aasta jooksul ei tarvitanud alkoholi 15% inimestest. Neid, kes tarvitasid alkoholi kaks või enam korda nädalas, oli kokku 16%, sagedamini juhtus seda meeste (24%) hulgas, võrreldes naistega (10%), ning sagedamini 45–54-aastaste vanuserühmas (21%) ja kõige vähem 16–24-aastaste (8%) hulgas. Nende hulgas, kes tarvitasid alkoholi vähemalt kaks korda nädalas, oli rohkem inimesi, kes tarvitasid ühel korral suuremas koguses alkoholi. Nendest 39% jõi tavaliselt ühel korral viis või enam ühikut alkoholi ja üle poole (56%) jõi kuus või enam ühikut alkoholi sagedamini kui kord kuus.

Probleemse alkoholi tarvitamise sh sõltuvuse esinemise hindamiseks kasutati AUDIT-C (ingl *Alcohol Use Disorders Identification Test*) testi, mis koosneb kolmest küsimusest alkoholi tarvitamise sageduse ja koguse kohta viimase 12 kuu jooksul ning mille põhjal arvutatakse ühtne skoor (6). AUDIT-C skoori põhjal esines 32% vastanutest probleemne alkoholi tarvitamine, meestel (45%) oluliselt sagedamini kui naistel (23%). Kui võrrelda probleemset alkoholi tarvitamist eri vanusrühmades, siis kõigis vanuserühmades esines seda meeste hulgas ligi kaks korda rohkem kui naiste hulgas, välja arvatud noorimas vanuserühmas, kus naiste hulgas oli enam probleemseid alkoholi tarvitajaid (joonis 7).




Joonis 7. Probleemne alkoholi tarvitamine (AUDIT-C skoori põhjal) soo ja vanuse järgi

5.3 Ravimite mittemeditsiiniline tarvitamine (tabelid 37–39)


Retseptiravimite tarvitamist mittemeditsiinilisel otstarbel sõnastati selles uuringus kui retseptiravimi tarvitamist ilma arsti ettekirjutuseta, suuremas koguses või teisel otstarbel kui arst on määranud. Küsimustikus küsiti retsepti alusel saadavate rahustite, uinutite või opiaatsete valuvaigistite (nt Xanax, alprasolaam, Valocordin, diasepaam, bromasepaam, Imovane, Somnols, Hypnogen, Stilnox, zolpideem, zopikloon, tramadool, kodeiin vms) mittemeditsiinilise tarvitamise kohta.

14% vastanutest oli elu jooksul tarvitanud ravimeid mittemeditsiinilisel otstarbel, naised pisut sagedamini kui mehed (16% vs 11%) (joonis 8). Kokku 3% oli teinud seda viimase aasta jooksul (4% naistest ja 1% meestest) ja 1% viimase kuu jooksul (1% nii naiste kui ka meeste hulgas). Ravimite mittemeditsiiniline tarvitamine oli pisut sagedam kõige vanemas vanuserühmas, 55–64 aastaste hulgas.



Joonis 8. Ravimite mittemeditsiiniline tarvitamine elu jooksul ning viimase 12 kuu jooksul soo ja vanuse järgi

Viimase aasta jooksul mittemeditsiinilisel eesmärgil ravimeid tarvitanutest tegi ligi kolmandik (36%) seda vähemalt kord kuus või sagedamini. Ravimite tarvitamise peamised mittemeditsiinilised põhjused olid enese ravimiseks, kas unetuse, valu või muu terviseprobleemi leevendamiseks, enesetunde parandamiseks ja stressi leevendamiseks (joonis 9). Ravimeid saadi: arsti varem välja kirjutatud retsepti alusel (60%, n=38), elukaaslaselt, sõbralt või teiselt lähedaselt (24%, n=15), toodi välismaalt (n=6), osteti tänavalt (n=3).



Joonis 9. Viimase 12 kuu jooksul ravimite (retsepti alusel kirjutatavad rahustid, uinutid, opiaatsed valuvaigistid) mittemeditsiinilisel otstarbel tarvitamise põhjused, %

5.4 Inhalandid (tabelid 40–41)

Inhalantide tarvitamise kohta küsiti, kas inimene on elu jooksul proovinud või tarvitanud liimi, lahustit, bensiini jt sarnaseid aineid ning välgumihkli gaasi või naerugaasi joobe saavutamise eesmärgil. Kokku 4% vastas, et on kunagi tarvitanud inhalante joobe saavutamiseks. Sagedamini oli seda teinud 25–54-aastased mehed, ligi 8%. Viimase aasta jooksul oli inhalantide tarvitajaid 0,3% (n=6).

5.5 Uute psühhoaktiivsete ainete tarvitamine (tabelid 42–43)

Uuteks psühhoaktiivseteks aineteks kutsutakse aineid, mis jäljendavad enamlevinud narkootikumide (nt kanep, *ecstasy*) toimet ning on alternatiiviks juba levinud ja tuntud narkootikumidele, kuid mille levitamist/tarvitamist ei ole veel jõutud keelustada, erinevalt tuntud narkootikumidest. Seetõttu nimetatakse neid ka vahel „legaalseteks narkootikumideks“ või „sünteesitud narkootikumideks“. Nad võivad esineda erineval kujul, nt taimse segu, pulbri, kristallide või tablettidena.


1% koguvahimist oli teadlikult tarvitanud selliseid aineid ja 3% oli neid, kes ei osanud öelda, kas võis olla tegemist uue psühhoaktiivse ainega. Kõige enam oli selliseid aineid tarvitanud 25–34-aastased mehed (4%). Viimase 12 kuu jooksul oli uute psühhoaktiivsete ainete tarvitamise levimus 0,4%. Neid aineid saadi sõbralt, osteti spetsiaalsest poest, internetist või tänavalt/festivalil/kontserdil.

5.6 Erinevate uimastite samaaegne tarvitamine (tabelid 44–45)

Samaaegse tarvitamise all mõeldi kahe või enama uimasti (nt alkohol ja ravimid, alkohol ja narkootikum, kaks uimastit või ravimit) järjestikkust tarvitamist koos või lühikese aja jooksul (nt ühe päeva jooksul).

15% kõikidest vastanutest on elu jooksul tarvitanud samaaegselt mitut uimastit, viimase aasta jooksul 5%. Meeste ja naiste vahel erinevusi ei olnud, pisut sagedamini esines seda alla 35-aastaste hulgas.

Kõige sagedamini tarvitati samaaegselt alkoholi ja kanepit. 16–34-aastaste hulgas oli kõige rohkem alkoholi ja kanepit samaaegselt tarvitavaid inimesi, meeste hulgas pisut enam kui naiste hulgas. Veel mainiti alkoholi ja ravimite koostarvitamist ning teiste narkootikumide (va kanep) tarvitamist koos alkoholiga. (joonis 10)



Joonis 10. Eri uimastite kombinatsioonide tarvitamine viimase 12 kuu jooksul vastavalt soole ja vanusele, %

Sagedasemad põhjused erinevate uimastite samaaegseks tarvitamiseks olid järgmised: valu leevendamine või muu eneseravi eesmärk (38% viimase 12 kuu jooksul samaaegselt mitut uimastit tarvitanutest), meeleolu või soorituse parandamine (38%), jooobeseisundi saavutamine (33%) ja eri ainete koosmõju katsetamine (20%). Lisaks mainiti tarvitamist ajaviiteks, meelelahutuseks, seltskondlikul eesmärgil, teise uimasti mõju lahjendamise või leevendamise eesmärgil.

6. Terviseseisund

6.1 Füüsiline tervis ja uimastite tarvitamisega seotud terviseprobleemid (tabelid 46–54)

Oma tervist hindas heaks või väga heaks 61%, keskmiseks 33% ja halvaks või väga halvaks 6% Eesti elanikest. Mehed ja naised hindasid oma tervist sarnaselt, vanuse kasvades suurenes oma tervist halvaks hinnanud osakaal.

Pisut üle poole (52%) vastanutest harrastas vähemalt 1–2 korda nädalas või sagedamini tervisesporti. Mehed olid võrreldes naistega vähem aktiivsed (vastavalt 49% ja 55%). Tervisespordi harrastamine vähenes oluliselt vanuse kasvades.

Igal seitsmendal inimesel oli esinenud terviseprobleeme alkoholi tarvitamise tõttu, nendest kolmandikul viimase aasta jooksul. Alkoholi tarvitamisega seotud terviseprobleeme esines sagedamini meestel ja 45–54-aastaste vanuserühmas. Kokku ligi 2% vastanutest on elu jooksul saanud ravi alkoholi liigtarvitamise tõttu, neid oli sagedamini meeste ja üle 35-aastaste hulgas.

Narkootikumide tarvitamisega seotud terviseprobleeme esines vähem kui 2% inimestest. Pisut rohkem esines probleeme meestel ja 25–34-aastaste vanuserühmas. Alla 1% vastajatest oli enda sõnul saanud kunagi ravi narkootikumide tarvitamise tõttu.

Rahustite, uimastite või tugevatoimeliste valuvaigistite tarvitamise tõttu esines terviseprobleeme ligi 4% inimestest. Selliseid terviseprobleeme esines sagedamini naistel kui meestel, samas vanuselist erinevust ei olnud.


Dopingainete tõttu esines terviseprobleeme kahel inimesel. Kui kolmveerand vastanutest vastas, et pole kunagi selliseid aineid kasutanud, siis 23% raporteeris dopingainete tarvitamise tõttu terviseprobleemide mitteesinemisest. Selle küsimuse ja vastusevariantide puhul on keeruline hinnata, kas nendel ligi veerandil vastanutest oli olnud dopingainete kasutamise kogemus.

6.2 Vaimne tervis ja seos uimastite tarvitamisega (tabel 55)


Vaimse tervise hindamiseks kasutati vaimse tervise mõõdikut MHI-5 (ingl *Mental Health Inventory*), mis koosneb viiest küsimusest närvilisuse, masenduse, rõhutud või kurb olemise kohta võrreldes rahuliku ja õnnelikuna tundmise kohta viimase nelja nädala jooksul. Küsimuste põhjal arvatud skoori võimalikud väärtused jäävad vahemikku 0–100, skoor ≤ 52 punkti viitab depressiooni sümptomite esinemisele (7).

Kõigi uuritavate keskmine vaimse tervise skoor oli 73 (standardhälve 16,6). Naiste ja meeste keskmised skoorid oluliselt ei erinenud (vastavalt 72 ja 74). Samuti ei olnud suuri vanuselisi erinevusi. Võrreldes depressiooni sümptomite esinemist (skoor ≤ 52), võib öelda, et 13% vastanutest esines depressiooni sümptomeid, naistel pisut sagedamini kui meestel (vastavalt 15% ja 10%). Võrreldes eri vanuserühmi, esines depressiooni sümptomeid kõige sagedamini noorimas vanuserühmas, 16–24-aastaste seas (18%).

Vaimne tervis on seotud üldise tervisehinnanguga ja inimese kehalise aktiivsusega. Uuritavad, kellel esines depressiooni sümptomeid, hindasid oluliselt halvemaks oma tervislikku seisundit ja olid füüsiliselt vähem aktiivsed (joonised 11, 12).



Joonis 11. Depressiooni sümptomite esinemise seos tervisehinnanguga, %




Joonis 12. Depressiooni sümptomite esinemise seos füüsilise aktiivsusega, %

Vähemalt korra elu jooksul narkootikume tarvitanutel esines sagedamini depressiooni sümptomeid kui mittetarvitanutel (15% vs 12%, $p = 0,054$) ja depressiooni sümptomeid leidis veelgi sagedamini viimase aasta jooksul narkootikume tarvitanutel (19% vs 12% $p = 0,017$). Samuti esines ravimeid mittemeditsiinilisel otstarbel tarvitanutel sagedamini depressiooni (elu jooksul tarvitanutel 18% vs mittetarvitanutel 12%, $p = 0,002$; viimase aasta jooksul tarvitanutel 33% vs 12%, $p < 0,001$).

Võrreldes mitut uimastit samaaegselt tarvitanuid, esines neil oluliselt sagedamini depressiooni kui mittetarvitanutel (19% vs 11%, $p < 0,001$).

Võrreldes alkoholi tarvitamist vastavalt AUDIT-C skoorile, esines probleemsetel alkoholarvitajatel sagedamini depressiooni sümptomeid (17% vs 11%, $p < 0,001$). Samuti esines depressiooni sümptomeid sagedamini iga päev suitsetajatel (19% vs 10% $p < 0,001$).

Joonisel 13 on esitatud arsti poolt määratud ravimite kasutamine vastavalt elu jooksul ja viimase aasta jooksul ning võib öelda, et vähem kui kümnendik on tarvitanud loetletud ravimeid viimase 12 kuu jooksul. Keskendumisraskuste tõttu stimulantide ja metadooni või buprenorfiini sõltuvuse asendusraviks kasutanud inimesi oli väga vähe, alla 0,5%, ja neid pole joonisel esitatud.




Joonis 13. Arsti poolt määratud ravimid erinevate terviseprobleemide esinemise puhul, %

7. Arvamused uimastitega seotud probleemidest, riskidest ja meetmetest

7.1 Uimastitega seotud probleemid (tabelid 56–60)

Enamik vastajaid pidas uimasteid Eestis probleemiks, üle poole (57%) hindas seda suureks ja kolmandik (34%) mõõdukaks probleemiks. Samas enda kodukohas pidas väiksem osa vastajatest uimasteid probleemiks. Naised pidasid uimasteid sagedamini probleemiks kui mehed (joonis 14). Nooremad kui 34-aastased vastajad pidasid uimasteid vähem probleemiks.



Joonis 14. Uimastite probleemiks pidamine üldiselt Eestis ja vastaja kodukohas soo järgi

69% leidis, et uimastite mõõdukas tarvitamine tekitab probleeme, naised pisut sagedamini kui mehed ning vanemad vastajad sagedamini kui nooremad.

42% uuringus osalenutest vastas, et on tundnud hirmu kellegi teise uimastitarvitamise tõttu vägivalda ohvriks sattumise pärast. Sagedamini olid tundnud seda naised ja üle 35-aastased vastajad. Ligi kolmandik oli neid, kes ei osanud vastata.


Uuritavatel paluti võrrelda, kumb tekitab Eesti ühiskonnas rohkem probleeme, kas alkohol või narkootikumid. Veidi alla poole (44%) pidas alkoholi ja narkootikume võrdselt sarnaseks probleemiks. Mõnevõrra rohkem oli neid (30%), kelle arvates on alkohol Eesti ühiskonnas suurem probleem, kui neid (25%), kes pidasid narkootikume suuremaks probleemiks. Kui võrrelda soolist erinevust, siis mehed hindasid sagedamini suuremaks probleemiks alkoholi ja naiste hulgas leiti, et mõlemad on võrdselt probleemiks. Vanuse põhjal võrreldes pidasid nooremad kui 44-aastased enam probleemiks alkoholi ja vanemad vastajad pigem narkootikume.

7.2 Sigarettide, alkoholi, narkootikumide ja anaboolsete steroidide tarvitamisega seotud risk tervisele (tabel 61)

Vastajatel paluti hinnata (skaalal riski pole, risk on väike, mõõdukas või suur), kui palju nende arvates riskib inimene enda kahjustamisega (füüsiliselt või mõnel muul viisil) tarvitades erinevaid uimasteid korra või kaks või regulaarselt.

Iga päev ühe või mitme sigaretipaki suitsetamist pidas enamik vastajatest terviseriskiks (68% pidas suureks ja 26% mõõdukaks riskiks). Sarnaselt leidis suurem osa, et vähemalt korra nädalas purju joomine on seotud enda kahjustamisega (55% pidas seda suureks ja 37% mõõdukaks riskiks).

Võrreldes erinevate narkootiliste ainete tarvitamisega seotud terviseriske, peeti fentanüüli tarvitamist kõige suuremaks riskiks ja kanepi proovimist kõige väiksemaks riskiks (joonis 15). Ligi kolmandik (35%) leidis, et kanepi ühe-kahekordne proovimine ei ole seotud või on seotud väikese riskiga. Stimulantide (*ecstasy*, amfetamiini) proovimisega seotud terviseriske hindas madalaks ligi kümnendik.




Joonis 15. Narkootikumide tarvitamisega seotud terviseriskide hinnangu jaotus, %

Kui eelnevates küsimustes küsiti üldiselt dopingainete kohta, siis selles küsimuses paluti hinnata konkreetselt anaboolsete steroidide tarvitamisega seotud terviseriske. Steroidide proovimist üks-

kaks korda pidas ligi kolmandik (30%) mõõdukaks riskiks ja üle poole (58%) suureks riskiks. Regulaarset tarvitamist pidas enamus (89%) suureks riskiks.

Üldjuhul hindasid naised erinevate ainete tarvitamisega seotud terviseriske suuremaks kui mehed. Vanusega võrreldes pidasid vanemad vastajad terviseriske suuremaks, kõige väiksemaks hindasid erinevate ainete tarvitamisega seotud terviseriske alla 25-aastased.


Kui võrrelda trende, on kasvanud Eesti elanike osakaal, kes hindavad iga päev suitsetamise ja purju joomisega seotud terviseriske suureks (joonis 16).



Joonis 16. Iga päev suitsetamise ja purju joomisega seotud terviseriski suureks hinnanud Eesti täiskasvanud elanike eri uuringute* ja aastate põhjal

*1998–2008 „Töö, kodu ja vaba aeg“ uuring, 1998. aastal valimis 18–70-aastased, aastatel 2003–2008 valimis 16–69-aastased

Kanepi ja *ecstasy* tarvitamisega seotud riskide trende võrreldes ilmnas, et kanepi proovimise ja regulaarse tarvitamisega seotud riske hinnati selles uuringus oluliselt sagedamini madalamaks, samas kui *ecstasy* proovimise ja tarvitamisega seotud riske hinnati sagedamini suuremaks kui varasemates uuringutes (joonis 17).




Joonis 17. Kanepi ja *ecstasy* proovimise ning regulaarse tarvitamisega seotud terviseriski suureks hinnanud Eesti täiskasvanud elanikud eri uuringute* ja aastate põhjal

*1998–2008 „Töö, kodu ja vaba aeg“ uuring, 1998. aastal valimis 18–70-aastased, aastatel 2003–2008 valimis 16–69-aastased


7.3 Uimastitega seotud seadusandlus (tabelid 62–64)

Küsites erinevate uimastite hankimisviiside ja tarvitamise eest karistamise kohta, arvati kõige sagedamini, et karistatav peaks olema retseptiravimite ostmine tänavalt või turult (68%) ja kanepitaimede kasvatamine (66%), kõige sallivamad oldi alkoholi ja retseptiravimite segatarvitamise suhtes (39%) (joonis 18).



Joonis 18. Eri uimastite hankimisviisi ja tarvitamise eest karistamisega nõustunud vastajate osakaal, %


63% leidis, et kanepi ostmine ei tohi olla lubatud, seevastu 24% arvas, et peaks olema lubatud, ja 13% nõustus, et see peaks olema lubatud ainult ravi eesmärgil. Kanepi tarvitamise lubamisega ei nõustunud üle poole (43% nõustus täielikult ja 12% nõustus osaliselt), samas 47% oli osaliselt või täielikult nõus kanepi tarvitamise lubamisega. Meeste hulgas oli pisut rohkem neid, kes osaliselt nõustusid, ja naiste hulgas oli rohkem mitterõustujaid. Nooremates vanuserühmades arvati sagedamini, et kanepi tarvitamine peaks olema lubatud (joonis 19).



Joonis 19. Kanepi tarvitamise lubamisega nõustumise jaotus vanuse järgi, %

7.4 Teabeallikad narkootiliste ainete kohta (tabel 65)

Narkootiliste ainete kohta teabe saamiseks peeti olulisemateks kohtadeks kooli, internetti, kodus lähedastelt ja meedia kaudu (joonis 20). Lisaks joonisel toodud loetelule mainiti reklaami, filme, raamatuid, teadusartikleid ja tuntud inimeste eeskju.



Joonis 20. Olulised teabeallikad narkootiliste ainete kohta info hankimisel, %

Kasutatud kirjandus

1. Hansson L. Töö, kodu ja vaba aeg: argielu Eestis aastatel 1985–2008. Tallinn: Tallinn Ülikooli Kirjastus, 2009.
2. Tekkel M, Veideman T. Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring 2016. Tallinn: Tervise Arengu Instituut, 2017.
3. Tekkel M, Veidemann T. Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring 2014. Tallinn: Tervise Arengu Instituut, 2015.
4. Turu-uuringute AS. Avaliku arvamuse ja riskikäitumise uuring 2015, täiskasvanud elanikkond. Politsei- ja Piirivalveamet, 2015. <https://www2.politsei.ee/dotAsset/601070.pdf>
5. EMCDDA. General population surveys — an overview of the methods and definitions used. European Drug Report 2014: Data and statistics. <http://www.emcdda.europa.eu/data/2014/methods-gps>
6. Bush K, Kivlahan DR, McDonell MB *et al.* The AUDIT alcohol consumption questions (AUDIT-C): an effective brief screening test for problem drinking. Ambulatory Care Quality Improvement Project (ACQUIP). Alcohol Use Disorders Identification Test. Arch Intern Med 1998;158:1789–95.
7. Berwick DM, Murphy JM, Goldman PA, Ware JE Jr, Barsky AJ, Weinstein MC. Performance of a five-item mental health screening test. Med Care 1991;29:169–76.

Tabelid

Tabel 1. Erinevate ainete kättesaadavus vastajate hinnangul soo ja vanuse järgi, %.....	29
Tabel 2. Soov proovida narkootilisi aineid, kui need ei oleks seadusevastased, soo ja vanuse järgi, %	30
Tabel 3. Narkootiliste ainete tarvitamine elu jooksul soo ja vanuse järgi, %.....	31
Tabel 4. Elu jooksul narkootilist ainet tarvitanute osakaal soo ja taustaandmete järgi.....	31
Tabel 5. Narkootiliste ainete tarvitamine viimase 12 kuu jooksul soo ja vanuse järgi, %.....	32
Tabel 6. Viimase 12 kuu jooksul narkootilist ainet tarvitanute osakaal soo ja taustaandmete järgi	32
Tabel 7. Narkootiliste ainete tarvitamine viimase 30 päeva jooksul soo ja vanuse järgi, %	33
Tabel 8. Viimase 30 päeva jooksul narkootilist ainet tarvitanute osakaal soo ja taustaandmete järgi	33
Tabel 9. Kanepi tarvitamine elu jooksul soo ja vanuse järgi, %.....	34
Tabel 10. Elu jooksul kanepit tarvitanute osakaal soo ja taustaandmete järgi	34
Tabel 11. Kanepi tarvitamise sagedus viimase 12 kuu jooksul soo ja vanuse järgi, %	35
Tabel 12. Viimase 12 kuu jooksul kanepit tarvitanute osakaal soo ja taustaandmete järgi	35
Tabel 13. Amfetamiini tarvitamine elu jooksul soo ja vanuse järgi, %.....	36
Tabel 14. Elu jooksul amfetamiini tarvitanute osakaal soo ja taustaandmete järgi	36
Tabel 15. Ecstasy tarvitamine elu jooksul soo ja vanuse järgi, %.....	37
Tabel 16. Elu jooksul ecstasy` t tarvitanute osakaal soo ja taustaandmete järgi.....	37
Tabel 17. Kokaiini tarvitamine elu jooksul soo ja vanuse järgi, %	38
Tabel 18. Elu jooksul kokaiini tarvitanute osakaal soo ja taustaandmete järgi	38
Tabel 19. Rahustite ja uinutite tarvitamine elu jooksul soo ja vanuse järgi, %	39
Tabel 20. Elu jooksul rahusteid ja uinuteid tarvitanute osakaal soo ja taustaandmete järgi	39
Tabel 21. Opioidide sh fentanüüli ja heroini tarvitamine elu jooksul soo ja vanuse järgi, %.....	40
Tabel 22. Elu jooksul opioide sh fentanüüli ja heroini tarvitanute osakaal soo ja taustaandmete järgi.....	40
Tabel 23. LSD tarvitamine elu jooksul soo ja vanuse järgi, %.....	41
Tabel 24. Elu jooksul LSD-d tarvitanute osakaal soo ja taustaandmete järgi.....	41
Tabel 25. GHB tarvitamine elu jooksul soo ja vanuse järgi, %.....	42
Tabel 26. Elu jooksul GHB-d tarvitanute osakaal soo ja taustaandmete järgi	42
Tabel 27. Uimastavate seente tarvitamine elu jooksul soo ja vanuse järgi, %.....	43
Tabel 28. Elu jooksul uimastavaid seeni tarvitanute osakaal soo ja taustaandmete järgi	43
Tabel 29. Probleemide esinemine seoses narkootikumide tarvitamisega soo ja vanuse järgi, %	44
Tabel 30. Vastajate jaotus suitsetamise alusel soo ja vanuse järgi, %	44
Tabel 31. Igapäevasuitsetajate jaotus soo, vanuse ja taustaandmete järgi.....	44
Tabel 32. Viimasel 12 kuul e-sigareti, vesipiibu ja huuletubaka (snus) tarvitamise sagedus soo ja vanuse järgi, %	45
Tabel 33. Vastajate jaotus viimase 12 kuu jooksul alkoholi tarvitamise sageduse alusel, soo ja vanuse järgi, %.	46
Tabel 34. Viimasel 12 kuul vähemalt mõned korrad nädalas alkoholi tarvitanute jaotus soo, vanuse ja taustaandmete järgi	46
Tabel 35. Viimasel 12 kuul korraga vähemalt kuue alkoholiühiku tarvitamise sagedus soo ja vanuse järgi, %....	47

Tabel 36. Viimasel 12 kuul vähemalt kord kuus korraga kuut või enam alkoholiühikut tarvitanud vastajate jaotus soo, vanuse ja taustaandmete järgi	47
Tabel 37. Ravimite mittemeditsiiniline tarvitamine elu jooksul soo ja vanuse järgi, %	48
Tabel 38. Elu jooksul ravimeid mittemeditsiinilisel otstarbel tarvitanud vastajate jaotus soo ja taustaandmete järgi.....	48
Tabel 39. Ravimite mittemeditsiiniline tarvitamine viimase 12 kuu jooksul soo ja vanuse järgi, %	49
Tabel 40. Inhalantide (sh liim, lahustid, bensiin, naerugaas, välgumihkli gaas) tarvitamine elu jooksul soo ja vanuse järgi, %	49
Tabel 41. Elu jooksul inhalante (sh liim, lahustid, bensiin, naerugaas, välgumihkli gaas) tarvitanud vastajate jaotus soo ja taustaandmete järgi.....	49
Tabel 42. Uute psühhoaktiivsete ainete tarvitamine elu jooksul soo ja vanuse järgi, %	50
Tabel 43. Elu jooksul uusi psühhoaktiivseid aineid tarvitanute jaotus soo ja taustaandmete järgi.....	50
Tabel 44. Erinevate uimastite samaaegne tarvitamine elu jooksul soo ja vanuse järgi, %	51
Tabel 45. Elu jooksul erinevaid uimasteid samaaegselt tarvitanud vastajad soo, vanuse ja taustaandmete järgi.....	51
Tabel 46. Vastajate jaotus tervise enesehinnangu, soo ja vanuse järgi, %	52
Tabel 47. Halva ja üsna halva tervise enesehinnanguga vastajate jaotus soo, vanuse ja taustaandmete järgi....	52
Tabel 48. Terviseprobleemide esinemine alkoholi tarvitamise tõttu soo ja vanuse järgi, %	53
Tabel 49. Terviseprobleemide esinemine narkootikumide tarvitamise tõttu soo ja vanuse järgi, %	53
Tabel 50. Terviseprobleemide esinemine rahustite, uinutite või valuvaigistite tarvitamise tõttu soo ja vanuse järgi, %.....	53
Tabel 51. Terviseprobleemide esinemine dopingainete tarvitamise tõttu soo ja vanuse järgi, %	53
Tabel 52. Alkoholi liigtarvitamise tõttu ravi saanud inimesed soo ja vanuse järgi, %	54
Tabel 53. Narkootikumide tarvitamise tõttu ravi saanud inimesed soo ja vanuse järgi, %	54
Tabel 54. Tervisespordi harrastamine soo ja vanuse järgi, %	55
Tabel 55. Depressiooni sümptomite (MHI-5 \leq 52) esinemine soo ja vanuse järgi.....	55
Tabel 56. Uimastite tarvitamine on Eestis probleemiks, vastajate jaotus soo ja vanuse järgi, %	56
Tabel 57. Uimastite tarvitamine on probleemiks minu elukohas, vastajate jaotus soo ja vanuse järgi, %.....	56
Tabel 58. Uimastite mõõdukas tarvitamine ei tekita probleeme, vastajate soo ja vanuse järgi, %.....	56
Tabel 59. Hirm sattuda vägivalla ohvriks teiste inimeste uimastitarvitamise tõttu, vastajate jaotus soo ja vanuse järgi, %.....	56
Tabel 60. Hinnang, kas alkohol või narkootilised ained on ohuks ühiskonnale, vastajate jaotus soo ja vanuse järgi, %.....	57
Tabel 61. Uimastite tarvitamisega seotud riskid, vastajate jaotus soo ja vanuse järgi, %	58
Tabel 62. Eri narkootiliste ainete tarvitamise ja hankimisviiside eest karistamine, vastajate jaotus soo ja vanuse järgi, %.....	59
Tabel 63. Kanepi ostmise seaduslikult lubamine, vastajate jaotus soo ja vanuse järgi, %.....	60
Tabel 64. Kanepi tarvitamise seaduslikult lubamine, vastajate jaotus soo ja vanuse järgi, %	60
Tabel 65. Erinevate teabeallikate olulisus narkootiliste ainete kohta soo ja vanuse järgi, %	61

Tabel 1. Erinevate ainete kättesaadavus vastajate hinnangul soo ja vanuse järgi, %

	Mehed					Kokku	Naised					Kokku	
	Vanuserühm						Vanuserühm						
	16–24	25–34	35–44	45–54	55–64		16–24	25–34	35–44	45–54	55–64		
<i>Kanep</i>													
Võimatu	4,6	0,5	4,1	2,7	3,9	3,1	1,3	1,8	2,3	2,5	4,0	2,5	2,7
Väga raske	4,6	3,2	4,6	5,9	4,4	4,5	2,0	2,8	4,2	3,9	3,4	3,4	3,8
Küllalt raske	6,4	9,6	8,7	7,5	4,9	7,5	8,5	10,3	6,1	6,1	4,6	6,9	7,1
Küllalt kerge	37,6	36,2	38,8	21,0	12,7	28,3	36,6	33,0	24,3	11,4	10,5	21,4	24,2
Väga kerge	32,1	28,2	7,7	9,1	2,9	14,2	35,3	25,2	12,6	5,7	3,4	14,2	14,2
Ei oska öelda	14,7	22,3	36,2	53,8	71,2	42,4	16,3	27,0	50,5	70,5	74,1	51,6	47,9
Kokku (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	117	194	197	188	212	908	159	287	267	284	329	1326	2234
Vastamata (arv)	8	6	1	2	7	24	6	5	4	3	5	23	47
<i>Amfetamiin</i>													
Võimatu	8,3	5,3	6,2	5,4	3,9	5,6	5,9	6,4	4,2	4,3	6,9	5,5	5,5
Väga raske	14,8	11,7	5,1	8,7	5,4	8,5	13,1	11,4	7,2	5,3	4,7	7,8	8,1
Küllalt raske	19,4	10,6	14,9	7,0	4,9	10,6	19,6	14,2	4,9	2,9	4,7	8,2	9,1
Küllalt kerge	17,6	17,0	22,1	12,4	8,8	15,3	14,4	15,0	14,8	7,1	5,6	10,9	12,7
Väga kerge	5,6	10,6	3,1	1,6	0,5	4,1	4,6	5,0	2,7	2,5	1,3	3,0	3,4
Ei oska öelda	34,3	44,7	48,7	64,9	76,5	55,9	42,5	48,0	66,2	77,9	77,0	64,6	61,1
Kokku (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	117	194	197	188	212	908	159	287	267	284	329	1326	2234
Vastamata (arv)	9	6	2	3	8	28	6	6	4	3	8	27	55
<i>Rahustid/uinutid</i>													
Võimatu	8,3	5,9	6,7	3,8	3,4	5,3	7,2	4,3	4,2	3,9	5,9	4,9	5,1
Väga raske	13,8	12,2	9,2	6,5	5,4	9,0	6,5	8,5	9,1	6,4	3,4	6,7	7,6
Küllalt raske	16,5	9,0	12,3	11,9	11,2	11,8	18,3	17,0	11,4	5,7	10,2	11,9	11,9
Küllalt kerge	17,4	13,3	18,5	14,1	10,7	14,5	17,7	18,1	10,3	8,5	7,4	11,8	12,9
Väga kerge	9,2	6,9	2,6	2,7	1,5	4,1	14,4	7,8	4,9	3,2	2,5	5,7	5,0
Ei oska öelda	34,9	52,7	50,8	61,1	67,8	55,3	36,0	44,3	60,1	72,2	70,6	59,1	57,6
Kokku (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	117	194	197	188	212	908	159	287	267	284	329	1326	2234
Vastamata (arv)	8	6	2	3	7	26	6	5	4	3	6	24	50
<i>Ecstasy</i>													
Võimatu	8,3	5,9	6,7	3,8	3,9	5,4	5,2	5,7	4,6	4,3	7,5	5,5	5,5
Väga raske	15,6	10,6	8,2	11,8	5,4	9,8	16,3	10,3	8,4	6,1	4,4	8,2	8,8
Küllalt raske	21,1	11,7	13,8	5,9	5,4	10,7	14,4	14,5	4,6	3,6	4,0	7,5	8,8
Küllalt kerge	19,3	18,1	16,4	11,3	9,3	14,4	19,6	17,0	12,6	5,7	4,7	10,9	12,3
Väga kerge	5,5	8,0	3,1	2,7	0,5	3,7	5,9	5,7	3,4	2,9	0,9	3,5	3,6
Ei oska öelda	30,3	45,7	51,8	64,5	75,4	56,0	38,6	46,8	66,5	77,6	78,5	64,3	61,0
Kokku (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	117	194	197	188	212	908	159	287	267	284	329	1326	2234
Vastamata (arv)	8	6	2	2	8	26	6	5	4	3	7	25	51
<i>Kokaiin</i>													
Võimatu	10,1	7,0	7,2	7,5	5,4	7,2	9,2	6,7	4,6	5,3	8,1	6,6	6,8
Väga raske	24,8	12,8	8,2	9,1	5,4	10,8	17,0	13,1	8,8	6,4	4,3	9,1	9,8
Küllalt raske	15,6	15,0	16,4	8,1	4,9	11,5	18,3	13,1	6,1	3,2	4,3	8,0	9,4
Küllalt kerge	8,3	13,4	13,3	6,5	7,8	10,0	15,0	13,1	10,7	5,7	4,6	9,1	9,5
Väga kerge	3,7	3,7	3,1	1,1	0,5	2,3	2,6	5,7	2,7	1,1	0,6	2,5	2,4
Ei oska öelda	37,6	48,1	51,8	67,7	76,0	58,2	37,9	48,2	67,3	78,3	78,2	64,8	62,1
Kokku (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	117	194	197	188	212	908	159	287	267	284	329	1326	2234
Vastamata (arv)	8	7	2	2	8	27	6	5	4	3	6	24	51
<i>Dopingained</i>													
Võimatu	10,1	8,0	6,7	5,4	4,9	6,7	7,8	7,1	5,3	5,0	7,1	6,4	6,5
Väga raske	13,8	10,1	8,7	9,7	5,9	9,2	12,4	12,1	9,5	5,7	4,0	8,2	8,6
Küllalt raske	17,4	10,1	12,3	4,8	4,4	9,1	15,7	12,4	4,9	2,5	4,3	7,1	7,9
Küllalt kerge	8,3	8,5	13,3	10,8	8,8	10,1	10,5	7,8	8,0	6,1	6,2	7,3	8,5
Väga kerge	4,6	4,3	2,1	1,6	1,0	2,5	2,6	4,6	1,9	1,8	1,2	2,4	2,4
Ei oska öelda	45,9	59,0	56,9	67,7	75,0	62,5	51,0	56,0	70,3	79,0	77,1	68,5	66,1
Kokku (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	117	194	197	188	212	908	159	287	267	284	329	1326	2234
Vastamata (arv)	8	6	2	2	8	26	6	5	4	3	6	24	50

Tabel 2. Soov proovida narkootilisi aineid, kui need ei oleks seadusevastased, soo ja vanuse järgi, %

	Mehed					Kokku	Naised					Kokku	
	Vanuserühm						Vanuserühm						
	16–24	25–34	35–44	45–54	55–64		16–24	25–34	35–44	45–54	55–64		
<i>Kanep</i>													
Jah, tarvitada	20,0	17,4	2,7	2,2	0,0	8,0	10,5	6,4	2,6	0,5	0,9	3,7	5,4
Jah, proovida	37,9	29,8	14,8	13,9	6,6	19,7	29,3	19,7	13,0	9,9	6,3	14,5	16,7
Ei soovi	29,5	44,7	71,8	78,8	86,9	63,9	51,9	65,6	73,4	83,6	85,6	73,7	69,7
Ei oska öelda	12,6	8,1	10,7	5,1	6,6	8,4	8,3	8,3	10,9	6,1	7,2	8,1	8,2
Kokku (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	117	194	197	188	212	908	159	287	267	284	329	1326	2234
Vastamata (arv)	22	33	48	51	75	229	26	69	75	71	107	348	577
<i>Ecstasy</i>													
Jah, tarvitada	2,1	1,2	0,0	1,5	0,0	0,9	0,8	0,0	0,0	0,0	0,9	0,3	0,6
Jah, proovida	15,6	9,9	3,4	2,2	0,7	5,9	8,3	5,1	1,0	1,0	0,0	2,7	4,0
Ei soovi	77,1	85,7	91,3	96,3	97,0	90,1	88,7	93,1	95,8	97,6	97,3	95,0	93,0
Ei oska öelda	5,2	3,1	5,4	0,0	2,2	3,1	2,3	1,8	3,1	1,4	1,8	2,1	2,5
Kokku (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	117	194	197	188	212	908	159	287	267	284	329	1326	2234
Vastamata (arv)	21	33	48	52	77	231	26	69	75	73	110	353	584
<i>Kokaiin</i>													
Jah, tarvitada	1,0	1,2	0,0	0,7	0,0	0,6	0,8	0,0	0,0	0,0	0,9	0,3	0,4
Jah, proovida	10,3	11,8	3,4	3,7	0,8	5,9	7,5	7,8	2,1	1,9	0,0	3,6	4,6
Ei soovi	84,5	83,2	89,3	94,1	97,0	89,6	89,5	90,8	94,8	96,7	97,3	94,2	92,3
Ei oska öelda	4,1	3,7	7,4	1,5	2,2	3,9	2,3	1,4	3,1	1,4	1,8	2,0	2,7
Kokku (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	117	194	197	188	212	908	159	287	267	284	329	1326	2234
Vastamata (arv)	20	33	48	53	78	232	26	69	75	72	110	352	584

Tabel 3. Narkootiliste ainete tarvitamine elu jooksul soo ja vanuse järgi, %

	Mehed					Kokku	Naised					Kokku	
	Vanuserühm						Vanuserühm						
	16–24	25–34	35–44	45–54	55–64		16–24	25–34	35–44	45–54	55–64		
Ei ole tarvitanud/proovinud	56,8	42,0	61,7	79,7	94,3	68,4	58,2	57,6	71,1	95,8	98,5	78,9	74,6
On tarvitanud/proovinud	43,2	58,0	38,3	20,3	5,7	31,6	41,8	42,4	28,9	4,2	1,5	21,1	25,4
Kokku (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	117	194	197	188	212	908	153	283	263	284	327	1310	2201
Vastamata (arv)	6	6	1	1	3	17	6	4	4	0	2	16	33

Tabel 4. Elu jooksul narkootilist ainet tarvitanute osakaal soo ja taustaandmete järgi

	Mehed		Naised		Kokku	
	On tarvitanud		On tarvitanud		Kokku	
	n	%	n	%	n	%
Haridus						
Alg- või põhi-	39	34,5	20	22,7	59	29,4
Kesk-	83	36,4	59	21,5	142	28,2
Keskeri-	71	25,4	51	14,8	122	19,6
Kõrg-	89	32,8	147	24,5	236	27,1
Elukoht						
Tallinn	107	40,7	121	27,8	228	32,6
Muu linn	84	26,4	74	19,0	158	22,3
Maapiirkond	91	29,4	82	16,9	173	21,8
Elupiirkond						
Põhja-Eesti	145	39,1	156	26,1	301	31,1
Lääne-Eesti	26	26,0	32	21,1	58	23,0
Kesk-Eesti	23	21,1	21	18,0	44	19,5
Kirde-Eesti	20	24,1	10	8,6	30	15,1
Lõuna-Eesti	68	29,8	58	17,7	126	22,7
Rahvus						
Eestlane	210	31,9	239	23,7	449	26,9
Mitte-eestlane	72	31,0	38	12,7	110	20,7
Majanduslik aktiivsus						
Töötav	236	34,2	180	18,9	416	25,3
Mittetöötav	29	19,5	85	29,2	114	25,9
Töötu	17	33,3	11	17,5	28	24,6
Kuusissetulek pereliikme kohta						
<450 eurot	39	19,3	48	16,0	87	17,3
451–1000 eurot	133	33,3	135	20,5	268	25,3
≥1001 eurot	107	40,7	90	28,0	197	33,7

Tabel 5. Narkootiliste ainete tarvitamine viimase 12 kuu jooksul soo ja vanuse järgi, %

	Mehed					Kokku	Naised					Kokku	
	Vanuserühm						Vanuserühm						
	16–24	25–34	35–44	45–54	55–64		16–24	25–34	35–44	45–54	55–64		
Ei ole tarvitanud/proovinud	73,0	78,1	95,4	97,9	99,0	90,3	80,4	90,1	97,3	99,3	99,7	94,8	93,0
On tarvitanud/proovinud	27,0	21,9	4,6	2,1	1,0	9,7	19,6	9,9	2,7	0,7	0,3	5,2	7,0
Kokku (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	117	194	197	188	212	908	159	287	267	284	329	1326	2234
Vastamata (arv)	6	7	1	1	4	19	6	4	4	0	2	16	35

Tabel 6. Viimase 12 kuu jooksul narkootilist ainet tarvitanute osakaal soo ja taustaandmete järgi

	Mehed		Naised		Kokku	
	On tarvitanud		On tarvitanud		Kokku	
	n	%	n	%	n	%
Haridus						
Alg- või põhi-	16	14,3	9	10,3	25	12,6
Kesk-	32	14,1	23	8,4	55	11,0
Keskeri-	16	5,7	8	2,3	24	3,8
Kõrg-	22	8,1	28	4,7	50	5,7
Elukoht						
Tallinn	30	11,4	31	7,1	61	8,7
Muu linn	32	10,3	18	3,7	50	5,3
Maapiirkond	24	7,6	19	4,9	43	6,1
Elupiirkond						
Põhja-Eesti	43	11,6	40	6,7	83	8,6
Lääne-Eesti	8	8,0	7	4,6	15	6,0
Kesk-Eesti	9	8,3	6	5,1	15	6,6
Kirde-Eesti	7	8,4	2	1,7	9	4,5
Lõuna-Eesti	19	8,4	13	4,0	32	5,8
Rahvus						
Eestlane	68	10,4	58	5,7	126	7,6
Mitte-eestlane	18	7,8	10	3,3	28	5,2
Majanduslik aktiivsus						
Töötav	63	9,2	37	3,9	100	6,1
Mittetöötav	17	11,4	25	8,6	42	9,6
Töötu	6	11,8	5	7,9	11	9,7
Kuusissetulek pereliikme kohta						
<450 eurot	10	4,9	17	5,7	27	5,4
451–1000 eurot	37	9,3	30	4,6	67	6,3
≥1001 eurot	39	14,9	21	6,5	60	10,3

Tabel 7. Narkootiliste ainete tarvitamine viimase 30 päeva jooksul soo ja vanuse järgi, %

	Mehed					Kokku	Naised					Kokku	
	Vanuserühm						Vanuserühm						
	16–24	25–34	35–44	45–54	55–64		16–24	25–34	35–44	45–54	55–64		
Ei ole tarvitanud/proovinud	89,2	90,4	99,0	98,9	100,0	96,2	94,8	97,2	8,5	99,7	100,0	98,4	97,5
On tarvitanud/proovinud	10,8	9,6	1,0	1,1	0,0	3,8	5,2	2,8	1,5	0,4	0,0	1,6	2,5
Kokku (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	117	194	197	188	212	908	159	287	267	284	329	1326	2234
Vastamata (arv)	6	7	1	1	4	19	6	4	4	0	2	16	35

Tabel 8. Viimase 30 päeva jooksul narkootilist ainet tarvitanute osakaal soo ja taustaandmete järgi

	Mehed		Naised		Kokku	
	On tarvitanud		On tarvitanud			
	n	%	n	%	n	%
Haridus						
Alg- või põhi-	7	6,3	5	5,8	12	6,0
Kesk-	13	5,7	3	1,1	16	3,2
Keskeri-	6	2,2	1	0,3	7	1,1
Kõrg-	8	2,9	12	2,0	20	2,3
Elukoht						
Tallinn	13	4,9	10	2,3	23	3,3
Muu linn	11	3,6	6	1,3	17	2,1
Maapiirkond	10	3,2	5	1,2	15	2,1
Elupiirkond						
Põhja-Eesti	19	5,1	14	2,4	33	3,4
Lääne-Eesti	2	2,0	2	1,3	4	1,6
Kesk-Eesti	3	2,8	2	1,7	5	2,2
Kirde-Eesti	1	1,2	1	0,9	2	1,0
Lõuna-Eesti	9	4,0	2	0,6	11	2,0
Rahvus						
Eestlane	30	4,6	16	1,6	46	2,8
Mitte-eestlane	4	1,7	5	1,7	9	1,7
Majanduslik aktiivsus						
Töötav	25	3,6	11	1,2	36	2,2
Mittetöötav	7	4,7	9	3,1	16	3,6
Töötu	2	3,9	1	1,6	3	2,6
Kuusissetulek pereliikme kohta						
<450 eurot	2	1,0	6	2,0	8	1,6
451–1000 eurot	13	3,3	10	1,5	23	2,2
≥1001 eurot	19	7,3	5	1,6	24	4,1

Tabel 9. Kanepi tarvitamine elu jooksul soo ja vanuse järgi, %

	Mehed					Kokku	Naised					Kokku	
	Vanuserühm						Vanuserühm						
	16–24	25–34	35–44	45–54	55–64		16–24	25–34	35–44	45–54	55–64		
Ei ole tarvitanud/proovinud	56,8	42,0	62,8	81,8	95,2	69,3	59,5	58,0	73,8	95,8	98,8	79,7	75,5
On tarvitanud/proovinud	43,2	58,0	37,2	18,2	4,8	30,8	40,5	42,1	26,2	4,2	1,2	20,3	24,5
Kokku (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	117	194	197	188	212	908	159	287	267	284	329	1326	2234
Vastamata (arv)	6	6	1	1	3	17	6	4	4	0	2	16	33

Tabel 10. Elu jooksul kanepit tarvitanute osakaal soo ja taustaandmete järgi

	Mehed		Naised		Kokku	
	On tarvitanud		On tarvitanud		Kokku	
	n	%	n	%	n	%
Haridus						
Alg- või põhi-	39	34,5	19	21,8	58	29,0
Kesk-	79	34,7	57	20,8	136	27,1
Keskeri-	69	24,7	45	13,0	114	18,2
Kõrg-	87	32,1	145	24,2	232	26,6
Elukoht						
Tallinn	104	39,5	119	27,3	223	31,9
Muu linn	88	28,4	75	15,5	163	20,5
Maapiirkond	82	25,8	72	18,5	154	21,8
Elupiirkond						
Põhja-Eesti	140	37,7	153	25,6	293	30,3
Lääne-Eesti	26	26,0	32	21,1	58	23,0
Kesk-Eesti	22	20,2	19	16,2	41	18,1
Kirde-Eesti	20	24,1	4	3,5	24	12,1
Lõuna-Eesti	66	29,0	58	17,7	124	22,3
Rahvus						
Eestlane	204	31,0	233	23,1	437	26,2
Mitte-eestlane	70	30,2	33	11,0	103	19,4
Majanduslik aktiivsus						
Töötav	228	33,0	172	18,0	400	24,3
Mittetöötav	29	19,5	83	28,5	112	25,5
Töötu	17	33,3	11	17,5	28	24,6
Kuusissetulek pereliikme kohta						
<450 eurot	35	17,2	44	14,7	79	15,7
451–1000 eurot	129	32,3	128	19,5	257	24,3
≥1001 eurot	107	40,8	90	27,9	197	33,7

Tabel 11. Kanepi tarvitamise sagedus viimase 12 kuu jooksul soo ja vanuse järgi, %

	Mehed					Kokku	Naised					Kokku	
	Vanuserühm						Vanuserühm						
	16–24	25–34	35–44	45–54	55–64		16–24	25–34	35–44	45–54	55–64		
Iga päev	0,9	0,5	0,0	0,5	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
Vähemalt korra nädalas	1,7	2,1	0,0	0,5	0,0	0,8	1,3	0,4	0,0	0,0	0,0	0,2	0,5
1–3 korda kuus	2,6	2,6	0,5	0,0	0,0	1,0	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,2	0,5
3–10 korda aastas	4,3	4,1	0,5	0,0	0,0	1,5	1,9	1,7	0,8	0,4	0,0	0,8	1,1
1-2 korda aastas	1,7	2,1	0,5	0,0	0,5	0,9	3,1	0,4	1,1	0,4	0,3	0,8	0,9
Pole tarvitanud viimasel 12 kuul	88,9	88,7	98,5	98,9	99,5	95,5	93,7	96,5	98,1	99,3	99,7	97,9	96,9
Kokku (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	117	194	197	188	212	908	159	287	267	284	329	1326	2234

Tabel 12. Viimase 12 kuu jooksul kanepit tarvitanute osakaal soo ja taustandmete järgi

	Mehed		Naised		Kokku	
	On tarvitanud		On tarvitanud			
	n	%	n	%	n	%
Haridus						
Alg- või põhi-	8	6,9	6	6,6	14	6,8
Kesk-	15	6,4	6	2,2	21	4,1
Keskeri-	9	3,2	2	0,6	11	1,7
Kõrg-	9	3,3	14	2,3	23	2,6
Elukoht						
Tallinn	16	5,9	12	2,7	28	3,9
Muu linn	14	4,4	6	1,2	20	2,5
Maapiirkond	11	3,4	10	2,5	21	2,9
Elupiirkond						
Põhja-Eesti	22	5,8	17	2,8	39	4,0
Lääne-Eesti	2	2,0	3	2,0	5	2,0
Kesk-Eesti	4	3,6	2	1,7	6	2,6
Kirde-Eesti	2	2,4	1	0,9	3	1,5
Lõuna-Eesti	11	4,7	5	1,5	16	2,8
Rahvus						
Eestlane	35	5,2	23	2,3	58	3,4
Mitte-eestlane	6	2,6	5	1,6	11	2,0
Majanduslik aktiivsus						
Töötav	30	4,3	15	1,6	45	2,7
Mittetöötav	7	4,6	11	3,7	18	4,0
Töötu	4	7,7	2	3,2	6	5,2
Kuusissetulek pereliikme kohta						
<450 eurot	3	1,5	7	2,3	10	2,0
451–1000 eurot	16	3,9	15	2,3	31	2,9
≥1001 eurot	22	8,2	6	1,8	28	4,7

Tabel 13. Amfetamiini tarvitamine elu jooksul soo ja vanuse järgi, %

	Mehed					Kokku	Naised					Kokku	
	Vanuserühm						Vanuserühm						
	16–24	25–34	35–44	45–54	55–64		16–24	25–34	35–44	45–54	55–64		
Ei ole tarvitanud/proovinud	94,6	84,0	82,1	96,8	100,0	91,4	92,8	92,9	90,9	99,3	99,7	95,6	93,9
On tarvitanud/proovinud	5,4	16,0	17,9	3,2	0,0	8,6	7,2	7,07	9,1	0,7	0,3	4,4	6,1
Kokku (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	117	194	197	188	212	908	159	287	267	284	329	1326	2234
Vastamata (arv)	6	6	1	1	3	17	6	4	4	0	2	16	33

Tabel 14. Elu jooksul amfetamiini tarvitanute osakaal soo ja taustaandmete järgi

	Mehed		Naised		Kokku	
	On tarvitanud		On tarvitanud		Kokku	
	n	%	n	%	n	%
Haridus						
Alg- või põhi-	16	14,2	5	5,8	21	10,5
Kesk-	26	11,4	11	4,0	37	7,4
Keskeri-	24	8,6	23	6,6	47	7,5
Kõrg-	11	4,1	19	3,2	30	3,4
Elukoht						
Tallinn	25	9,5	23	5,3	48	6,9
Muu linn	30	9,7	22	4,6	52	6,6
Maapiirkond	22	6,2	13	3,3	35	4,9
Elupiirkond						
Põhja-Eesti	37	10,0	32	5,4	69	7,1
Lääne-Eesti	5	5,0	4	2,6	9	3,6
Kesk-Eesti	8	7,3	4	3,4	12	5,3
Kirde-Eesti	8	9,6	7	6,0	15	7,5
Lõuna-Eesti	19	8,3	11	3,4	30	5,4
Rahvus						
Eestlane	52	7,9	42	4,2	94	5,6
Mitte-eestlane	25	10,8	16	5,4	41	7,7
Majanduslik aktiivsus						
Töötav	72	10,4	42	4,4	114	6,9
Mittetöötav	2	1,3	13	4,5	15	3,4
Töötu	3	5,9	2	3,2	5	4,4
Kuusissetulek pereliikme kohta						
<450 eurot	9	4,4	13	4,3	22	4,4
451–1000 eurot	36	9,0	30	4,6	66	6,2
≥1001 eurot	32	12,2	15	4,6	47	8,0

Tabel 15. Ecstasy tarvitamine elu jooksul soo ja vanuse järgi, %

	Mehed					Kokku	Naised					Kokku	
	Vanuserühm						Vanuserühm						
	16–24	25–34	35–44	45–54	55–64		16–24	25–34	35–44	45–54	55–64		
Ei ole tarvitanud/proovinud	93,7	80,9	90,3	97,9	99,5	92,5	94,1	90,1	94,7	99,6	100,0	96,0	94,6
On tarvitanud/proovinud	6,3	19,2	9,7	2,1	0,5	7,5	5,89	9,9	5,3	0,4	0,0	4,0	5,4
Kokku (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	117	194	197	188	212	908	159	287	267	284	329	1326	2234
Vastamata (arv)	6	6	1	1	3	17	6	4	4	0	2	16	33

Tabel 16. Elu jooksul ecstasy` t tarvitanute osakaal soo ja taustaandmete järgi

	Mehed		Naised		Kokku	
	On tarvitanud		On tarvitanud		Kokku	
	n	%	n	%	n	%
Haridus						
Alg- või põhi-	11	9,7	3	3,5	14	7,0
Kesk-	17	7,5	10	3,7	27	5,4
Keskeri-	23	8,2	13	3,8	36	5,8
Kõrg-	16	5,9	26	4,3	42	4,8
Elukoht						
Tallinn	22	8,4	25	5,7	47	6,7
Muu linn	26	8,4	17	3,5	43	5,4
Maapiirkond	19	6,0	10	2,6	29	4,1
Elupiirkond						
Põhja-Eesti	31	8,4	34	5,7	65	6,7
Lääne-Eesti	5	5,0	5	3,3	10	4,0
Kesk-Eesti	7	6,4	4	3,4	11	4,9
Kirde-Eesti	4	4,8	1	0,9	5	2,5
Lõuna-Eesti	20	8,8	8	2,4	28	5,0
Rahvus						
Eestlane	50	7,6	39	3,9	89	5,3
Mitte-eestlane	17	7,3	13	4,4	30	5,7
Majanduslik aktiivsus						
Töötav	61	8,8	38	4,0	99	6,0
Mittetöötav	3	2,0	11	3,8	14	3,2
Töötu	3	5,9	2	3,2	5	4,4
Kuusissetulek pereliikme kohta						
<450 eurot	8	3,9	7	2,3	15	3,0
451–1000 eurot	26	6,5	30	4,6	56	5,3
≥1001 eurot	33	12,6	15	4,6	48	8,2

Tabel 17. Kokaiini tarvitamine elu jooksul soo ja vanuse järgi, %

	Mehed					Kokku	Naised					Kokku	
	Vanuserühm						Vanuserühm						
	16–24	25–34	35–44	45–54	55–64		16–24	25–34	35–44	45–54	55–64		
Ei ole tarvitanud/proovinud	97,3	85,1	87,2	97,3	99,5	93,0	93,5	92,2	93,9	99,7	100,0	96,3	95,0
On tarvitanud/proovinud	2,7	14,9	12,8	2,7	0,5	7,0	6,5	7,8	6,1	0,3	0,0	3,74	5,0
Kokku (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	117	194	197	188	212	908	159	287	267	284	329	1326	2234
Vastamata (arv)	6	6	1	1	3	17	6	4	4	0	2	16	33

Tabel 18. Elu jooksul kokaiini tarvitanute osakaal soo ja taustaandmete järgi

	Mehed		Naised		Kokku	
	On tarvitanud		On tarvitanud		Kokku	
	n	%	n	%	n	%
Haridus						
Alg- või põhi-	9	8,0	2	2,3	11	5,5
Kesk-	19	8,3	8	2,9	27	5,4
Kesk-eri-	19	6,8	12	3,5	31	5,0
Kõrg-	15	5,5	27	4,5	42	4,8
Elukoht						
Tallinn	22	8,4	28	6,4	50	7,2
Muu linn	25	8,1	13	2,7	38	4,8
Maapiirkond	15	4,7	8	2,1	23	3,3
Elupiirkond						
Põhja-Eesti	31	8,4	34	5,7	65	6,7
Lääne-Eesti	4	4,0	4	2,6	8	3,2
Kesk-Eesti	5	4,6	3	2,6	8	3,5
Kirde-Eesti	5	6,0	1	0,9	6	3,0
Lõuna-Eesti	17	7,5	7	2,1	24	4,3
Rahvus						
Eestlane	44	6,7	41	4,1	85	5,1
Mitte-eestlane	18	7,8	8	2,7	26	4,9
Majanduslik aktiivsus						
Töötav	59	8,6	36	3,8	95	5,8
Mittetöötav	1	0,7	13	4,5	14	3,2
Töötu	2	3,9	0	0,0	2	1,8
Kuusissetulek pereliikme kohta						
<450 eurot	4	2,0	10	3,3	14	2,8
451–1000 eurot	22	5,5	22	3,4	44	4,2
≥1001 eurot	36	13,7	17	5,3	53	9,1

Tabel 19. Rahustite ja uinutite tarvitamine elu jooksul soo ja vanuse järgi, %

	Mehed					Kokku	Naised					Kokku	
	Vanuserühm						Vanuserühm						
	16–24	25–34	35–44	45–54	55–64		16–24	25–34	35–44	45–54	55–64		
Ei ole tarvitanud/proovinud	97,3	92,6	95,9	96,3	99,5	96,3	95,4	96,8	97,0	99,7	99,4	97,9	97,3
On tarvitanud/proovinud	2,7	7,5	4,1	3,7	0,5	3,7	4,6	3,2	3,0	0,3	0,6	2,1	2,7
Kokku (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	117	194	197	188	212	908	159	287	267	284	329	1326	2234
Vastamata (arv)	6	6	1	1	3	17	6	4	4	0	2	16	33

Tabel 20. Elu jooksul rahusteid ja uinuteid tarvitanute osakaal soo ja taustaandmete järgi

	Mehed		Naised		Kokku	
	On tarvitanud		On tarvitanud		Kokku	
	n	%	n	%	n	%
Haridus						
Alg- või põhi-	6	5,3	2	2,3	8	4,0
Kesk-	10	4,4	7	2,6	17	3,4
Keskeri-	9	3,2	6	1,7	15	2,4
Kõrg-	8	3,0	12	2,0	20	2,3
Elukoht						
Tallinn	7	2,7	13	3,0	20	2,9
Muu linn	16	5,2	9	1,9	25	3,2
Maapiirkond	10	3,1	5	1,3	15	2,1
Elupiirkond						
Põhja-Eesti	13	3,5	13	2,2	26	2,7
Lääne-Eesti	2	2,0	3	2,0	5	2,0
Kesk-Eesti	4	3,7	2	1,7	6	2,7
Kirde-Eesti	4	4,8	3	2,6	7	3,5
Lõuna-Eesti	10	4,4	6	1,8	16	2,9
Rahvus						
Eestlane	23	3,5	21	2,1	44	2,6
Mitte-eestlane	10	4,3	6	2,0	16	3,0
Majanduslik aktiivsus						
Töötav	29	4,2	22	2,3	51	3,1
Mittetöötav	1	0,7	5	1,7	6	1,4
Töötu	3	5,9	0	0,0	3	2,6
Kuusissetulek pereliikme kohta						
<450 eurot	6	3,0	5	1,7	11	2,2
451–1000 eurot	15	3,8	15	2,3	30	2,8
≥1001 eurot	12	4,6	7	2,2	19	3,3

Tabel 21. Opioidide sh fentanüüli ja heroini tarvitamine elu jooksul soo ja vanuse järgi, %

	Mehed					Kokku	Naised					Kokku	
	Vanuserühm						Vanuserühm						
	16–24	25–34	35–44	45–54	55–64		16–24	25–34	35–44	45–54	55–64		
Ei ole tarvitanud/proovinud	99,10	96,28	98,98	97,33	99,52	98,20	99,35	98,59	98,86	100,00	100,00	99,39	98,91
On tarvitanud/proovinud	0,90	3,72	1,02	2,67	0,48	1,80	0,65	1,41	1,14	0,00	0,00	0,61	1,09
Kokku (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	117	194	197	188	212	908	159	287	267	284	329	1326	2234
Vastamata (arv)	6	6	1	1	3	17	6	4	4	0	2	16	33

Tabel 22. Elu jooksul opioide sh fentanüüli ja heroini tarvitanute osakaal soo ja taustaandmete järgi

	Mehed		Naised		Kokku	
	On tarvitanud		On tarvitanud		Kokku	
	n	%	n	%	n	%
Haridus						
Alg- või põhi-	3	2,7	1	1,2	4	2,0
Kesk-	5	2,2	1	0,4	6	1,2
Keskeri-	3	1,1	2	0,6	5	0,8
Kõrg-	5	1,9	4	0,7	9	1,0
Elukoht						
Tallinn	4	1,5	3	0,7	7	1,0
Muu linn	7	2,3	4	0,8	11	1,4
Maapiirkond	5	1,6	1	0,3	6	0,9
Elupiirkond						
Põhja-Eesti	7	1,9	3	0,5	10	1,0
Lääne-Eesti	1	1,0	1	0,7	2	0,8
Kesk-Eesti	4	3,7	0	0,0	4	1,8
Kirde-Eesti	0	0,0	2	1,7	2	1,0
Lõuna-Eesti	4	1,8	2	0,6	6	1,1
Rahvus						
Eestlane	9	1,4	4	0,4	13	0,8
Mitte-eestlane	7	3,0	4	1,3	11	2,1
Majanduslik aktiivsus						
Töötav	16	2,3	6	0,6	22	1,3
Mittetöötav	0	0,0	2	0,7	2	0,5
Töötu	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Kuusissetulek pereliikme kohta						
<450 eurot	5	2,5	3	1,0	8	1,6
451–1000 eurot	4	1,0	4	0,6	8	0,8
≥1001 eurot	7	2,7	1	0,3	8	1,4

Tabel 23. LSD tarvitamine elu jooksul soo ja vanuse järgi, %

	Mehed					Kokku	Naised					Kokku	
	Vanuserühm						Vanuserühm						
	16–24	25–34	35–44	45–54	55–64		16–24	25–34	35–44	45–54	55–64		
Ei ole tarvitanud/proovinud	92,8	93,6	98,0	98,9	100,0	97,1	98,0	97,2	98,9	99,7	100,0	98,9	98,1
On tarvitanud/proovinud	7,2	6,4	2,0	1,1	0,0	2,9	2,0	2,8	1,1	0,3	0,0	1,1	1,9
Kokku (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	117	194	197	188	212	908	159	287	267	284	329	1326	2234
Vastamata (arv)	6	6	1	1	3	17	6	4	4	0	2	16	33

Tabel 24. Elu jooksul LSD-d tarvitanute osakaal soo ja taustaandmete järgi

	Mehed		Naised		Kokku	
	On tarvitanud		On tarvitanud		Kokku	
	n	%	n	%	n	%
Haridus						
Alg- või põhi-	7	6,2	3	3,5	10	5,0
Kesk-	9	4,0	1	0,4	10	2,0
Keskeri-	5	1,8	2	0,6	7	1,1
Kõrg-	5	1,9	9	1,5	14	1,6
Elukoht						
Tallinn	11	4,2	4	0,9	15	2,2
Muu linn	7	2,3	6	1,2	13	1,6
Maapiirkond	8	2,5	5	1,3	13	1,8
Elupiirkond						
Põhja-Eesti	15	4,0	8	1,3	23	2,4
Lääne-Eesti	1	1,0	0	0,0	1	0,4
Kesk-Eesti	1	0,9	1	0,9	2	0,9
Kirde-Eesti	0	0,0	2	1,7	2	1,0
Lõuna-Eesti	9	4,0	4	1,2	13	2,3
Rahvus						
Eestlane	21	3,2	11	1,1	32	1,9
Mitte-eestlane	5	2,2	4	1,3	9	1,7
Majanduslik aktiivsus						
Töötav	21	3,0	10	1,1	31	1,9
Mittetöötav	3	2,0	5	1,7	8	1,8
Töötu	2	3,9	0	0,0	2	1,8
Kuusissetulek pereliikme kohta						
<450 eurot	2	1,0	5	1,7	7	1,4
451–1000 eurot	11	2,8	5	0,8	16	1,5
≥1001 eurot	13	5,0	5	1,6	18	3,1

Tabel 25. GHB tarvitamine elu jooksul soo ja vanuse järgi, %

	Mehed					Kokku	Naised					Kokku	
	Vanuserühm						Vanuserühm						
	16–24	25–34	35–44	45–54	55–64		16–24	25–34	35–44	45–54	55–64		
Ei ole tarvitanud/proovinud	98,2	94,2	95,9	98,9	100,0	97,4	97,4	96,5	97,7	99,6	100,0	98,4	98,0
On tarvitanud/proovinud	1,8	5,8	4,1	1,1	0,0	2,6	2,6	3,5	2,3	0,4	0,0	1,6	2,0
Kokku (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	117	194	197	188	212	908	159	287	267	284	329	1326	2234
Vastamata (arv)	6	6	1	1	3	17	6	4	4	0	2	16	33

Tabel 26. Elu jooksul GHB-d tarvitanute osakaal soo ja taustaandmete järgi

	Mehed		Naised		Kokku	
	On tarvitanud		On tarvitanud		Kokku	
	n	%	n	%	n	%
Haridus						
Alg- või põhi-	5	4,4	0	0,0	5	2,5
Kesk-	6	2,6	7	2,6	13	2,6
Keskeri-	7	2,5	5	1,4	12	1,9
Kõrg-	5	1,9	9	1,5	14	1,6
Elukoht						
Tallinn	3	1,1	10	2,3	13	1,9
Muu linn	10	3,2	4	0,8	14	1,8
Maapiirkond	10	3,1	7	1,8	17	2,4
Elupiirkond						
Põhja-Eesti	9	2,4	12	2,0	21	2,2
Lääne-Eesti	1	1,0	4	2,6	5	2,0
Kesk-Eesti	2	1,8	1	0,9	3	1,3
Kirde-Eesti	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Lõuna-Eesti	11	4,8	4	1,2	15	2,7
Rahvus						
Eestlane	22	3,3	20	2,0	42	2,5
Mitte-eestlane	1	0,4	1	0,3	2	0,4
Majanduslik aktiivsus						
Töötav	21	3,0	14	1,5	35	2,1
Mittetöötav	1	0,7	6	2,1	7	1,6
Töötu	1	2,0	1	1,6	2	1,8
Kuusissetulek pereliikme kohta						
<450 eurot	3	1,5	4	1,3	7	1,4
451–1000 eurot	7	1,8	10	1,5	17	1,6
≥1001 eurot	13	5,0	7	2,2	20	3,4

Tabel 27. Uimastavate seente tarvitamine elu jooksul soo ja vanuse järgi, %

	Mehed					Kokku	Naised					Kokku	
	Vanuserühm						Vanuserühm						
	16–24	25–34	35–44	45–54	55–64		16–24	25–34	35–44	45–54	55–64		
Ei ole tarvitanud/proovinud	96,4	85,1	96,9	97,9	100,0	95,3	99,4	95,4	98,9	100,0	100,0	98,7	97,3
On tarvitanud/proovinud	3,6	14,9	3,1	2,1	0,0	4,7	0,7	4,6	1,1	0,0	0,0	1,3	2,7
Kokku (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	117	194	197	188	212	908	159	287	267	284	329	1326	2234
Vastamata (arv)	6	6	1	1	3	17	6	4	4	0	2	16	33

Tabel 28. Elu jooksul uimastavaid seeni tarvitanute osakaal soo ja taustaandmete järgi

	Mehed		Naised		Kokku	
	On tarvitanud		On tarvitanud		Kokku	
	n	%	n	%	n	%
Haridus						
Alg- või põhi-	9	8,0	0	0,0	9	4,5
Kesk-	13	5,7	1	0,4	14	2,8
Keskeri-	7	2,5	1	0,3	8	1,3
Kõrg-	13	4,8	15	2,5	28	3,2
Elukoht						
Tallinn	17	6,5	8	1,8	25	3,6
Muu linn	14	4,5	5	1,0	19	2,4
Maapiirkond	11	3,5	4	1,0	15	2,1
Elupiirkond						
Põhja-Eesti	23	6,2	13	2,2	36	3,7
Lääne-Eesti	5	5,0	1	0,7	6	2,4
Kesk-Eesti	1	0,9	0	0,0	1	0,4
Kirde-Eesti	2	2,4	0	0,0	2	1,0
Lõuna-Eesti	11	4,8	3	0,9	14	2,5
Rahvus						
Eestlane	33	5,0	16	1,6	49	2,9
Mitte-eestlane	9	3,9	1	0,3	10	1,9
Majanduslik aktiivsus						
Töötav	38	5,5	13	1,4	51	3,1
Mittetöötav	2	1,3	4	1,4	6	1,4
Töötu	2	3,9	0	0,0	2	1,8
Kuusissetulek pereliikme kohta						
<450 eurot	2	1,0	2	0,7	4	0,8
451–1000 eurot	17	4,3	7	1,1	24	2,3
≥1001 eurot	23	8,8	8	2,5	31	5,3

Tabel 29. Probleemide esinemine seoses narkootikumide tarvitamisega soo ja vanuse järgi, %

	Mehed					Kokku	Naised					Kokku	
	Vanuserühm						Vanuserühm						
	16–24	25–34	35–44	45–54	55–64		16–24	25–34	35–44	45–54	55–64		
Ei	94,9	95,9	99,5	99,5	100,0	98,2	99,4	99,3	99,3	100,0	100,0	99,6	99,1
Jah	5,1	4,1	0,5	0,5	0,0	1,8	0,6	0,7	0,7	0,0	0,0	0,4	0,9
Kokku (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	117	194	197	188	212	908	159	287	267	284	329	1326	2234

Tabel 30. Vastajate jaotus suitsetamise alusel soo ja vanuse järgi, %

	Mehed					Kokku	Naised					Kokku	
	Vanuserühm						Vanuserühm						
	16–24	25–34	35–44	45–54	55–64		16–24	25–34	35–44	45–54	55–64		
Ma ei ole kunagi suitsetanud	53,0	31,4	37,1	29,4	25,9	33,7	50,3	51,1	55,9	52,8	50,8	52,2	44,7
lah, iga päev	15,7	23,6	19,1	30,0	29,7	24,4	12,9	8,8	9,8	12,0	13,7	11,4	16,7
lah, peaaegu iga päev	4,4	2,1	3,1	2,7	5,2	3,5	3,2	1,8	1,9	2,8	4,0	2,7	3,0
lah, suitsetan mõnikord	7,8	12,6	7,7	4,8	2,4	6,9	14,8	7,0	6,0	4,9	2,7	6,2	6,5
Olen varem suitsetanud, kuid praegu loobunud	19,1	30,4	33,0	33,2	36,8	31,6	18,7	31,3	26,4	27,5	28,9	27,4	29,1
Kokku (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	117	194	197	188	212	908	159	287	267	284	329	1326	2234
Vastamata (arv)		2	3	3	1	0	9	4	3	2	0	0	9

Tabel 31. Igapäevasuitsetajate jaotus soo, vanuse ja taustandmete järgi

	Mehed		Naised		Kokku	
	Suitsetab iga päev		Suitsetab iga päev			
	n	%	n	%	n	%
Vanus						
16–24	23	20,0	25	16,1	48	17,8
25–34	49	25,7	30	10,6	79	16,6
35–44	43	22,2	31	11,7	74	16,2
45–54	61	32,6	42	14,8	103	21,9
55–64	74	34,9	58	17,6	132	24,4
Haridus						
Alg- või põhi-	47	40,9	31	35,2	78	38,4
Kesk-	72	31,2	62	22,5	134	26,4
Keskeri-	96	34,3	56	16,0	152	24,1
Kõrg-	35	12,8	37	6,2	72	8,2
Elukoht						
Tallinn	59	22,2	54	12,3	113	16,1
Muu linn	89	28,3	62	12,7	151	18,8
Maapiirkond	102	32,0	70	17,9	172	24,2
Elupiirkond						
Põhja-Eesti	95	25,3	75	12,5	170	17,4
Lääne-Eesti	24	24,0	28	18,4	52	20,6
Kesk-Eesti	32	28,8	20	17,0	52	22,7
Kirde-Eesti	24	28,9	17	14,5	41	20,5
Lõuna-Eesti	75	32,6	46	13,9	121	21,6
Rahvus						
Eestlane	176	26,4	148	14,6	324	19,3
Mitte-eestlane	74	31,9	38	12,6	112	21,0
Majanduslik aktiivsus						
Töötav	190	27,3	143	14,9	333	20,1
Mittetöötav	35	23,2	32	10,5	68	14,8
Töötu	24	46,2	11	17,5	35	30,4
Kuusissetulek pereliikme kohta						
<450 eurot	71	34,6	52	17,3	123	24,4
451–1000 eurot	116	27,2	96	14,4	212	19,3
≥1001 eurot	63	23,8	38	11,6	101	17,1

Tabel 32. Viimasel 12 kuul e-sigareti, vesipiibu ja huuletubaka (snus) tarvitamise sagedus soo ja vanuse järgi, %

	Mehed					Kokku	Naised					Kokku	
	Vanuserühm						Vanuserühm						
	16–24	25–34	35–44	45–54	55–64		16–24	25–34	35–44	45–54	55–64		
<i>Vesipiip</i>													
Mitte kordagi	58,8	70,4	90,7	97,8	99,0	85,7	61,5	81,3	95,8	97,5	99,7	89,9	88,2
Mõni kord aastas	38,6	26,5	8,3	1,6	1,0	12,9	31,4	17,3	3,8	2,5	0,3	8,9	10,6
Mõni kord kuus	1,8	3,2	1,0	0,0	0,0	1,1	6,4	1,1	0,0	0,0	0,0	1,0	1,1
Mõni kord													
nädalas	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,6	0,4	0,4	0,0	0,0	0,2	0,2
Iga päev	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
Kokku (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	117	194	197	188	212	908	159	287	267	284	329	1326	2234
Vastamata (arv)	3	5	3	4	3	18	3	3	5	2	13	26	44
<i>E-sigaret</i>													
Mitte kordagi	60,0	80,9	93,3	95,1	97,1	87,6	78,2	94,7	96,6	95,7	98,7	94,3	91,6
Mõni kord aastas	26,1	11,2	3,1	1,6	1,9	7,2	16,7	3,2	2,3	3,2	0,3	3,9	5,3
Mõni kord kuus	6,1	1,6	0,5	1,1	0,0	1,5	1,9	0,4	0,8	0,0	0,0	0,5	0,9
Mõni kord													
nädalas	3,5	2,1	1,0	0,5	0,0	1,2	1,9	0,7	0,4	0,7	0,3	0,7	0,9
Iga päev	4,4	4,3	2,1	1,6	1,0	2,5	1,3	1,1	0,0	0,4	0,6	0,6	1,4
Kokku (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	117	194	197	188	212	908	159	287	267	284	329	1326	2234
Vastamata (arv)	2	6	2	4	5	19	3	5	6	2	15	31	50
<i>Põsk- või huuletubakas (snus)</i>													
Mitte kordagi	73,5	83,1	93,8	96,8	99,0	90,8	95,5	98,9	98,9	99,3	99,7	98,8	95,5
Mõni kord aastas	15,0	7,9	3,1	1,1	0,5	4,6	1,9	0,7	1,2	0,7	0,0	0,8	2,3
Mõni kord kuus	4,4	2,1	0,0	0,5	0,0	1,1	0,6	0,0	0,0	0,0	0,3	0,2	0,6
Mõni kord													
nädalas	4,4	3,2	1,0	1,1	0,5	1,8	0,6	0,4	0,0	0,0	0,0	0,2	0,8
Iga päev	2,7	3,7	2,1	0,5	0,0	1,7	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,8
Kokku (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	117	194	197	188	212	908	159	287	267	284	329	1326	2234
Vastamata (arv)	4	5	3	1	5	18	3	6	7	3	14	33	51

Tabel 33. Vastajate jaotus viimase 12 kuu jooksul alkoholi tarvitamise sageduse alusel, soo ja vanuse järgi, %

	Mehed					Kokku	Naised					Kokku	
	Vanuserühm						Vanuserühm						
	16–24	25–34	35–44	45–54	55–64		16–24	25–34	35–44	45–54	55–64		
Mitte kunagi	20,4	10,0	10,8	4,8	15,2	11,6	18,6	15,8	14,7	14,8	19,4	16,6	14,6
Kord kuus või harvem	45,1	20,4	24,6	23,0	24,8	26,0	39,1	39,3	41,9	38,4	48,0	41,8	35,4
2–4 korda kuus	26,6	48,7	35,4	41,2	35,7	38,4	34,6	35,4	35,5	32,0	24,9	32,0	34,6
2–3 korda nädalas	7,1	16,8	23,1	18,7	18,1	17,6	7,7	8,4	7,2	12,0	5,9	8,2	12
4 või enam korda nädalas	0,9	4,2	6,2	12,3	6,2	6,4	0,0	1,1	0,8	2,8	1,9	1,4	3,4
Kokku (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	117	194	197	188	212	908	159	287	267	284	329	1326	2234
Vastamata (arv)	4	3	2	1	2	12	3	2	2	0	4	11	23

Tabel 34. Viimasel 12 kuul vähemalt mõned korrad nädalas alkoholi tarvitanute jaotus soo, vanuse ja taustaandmete järgi

	Mehed		Naised		Kokku	
	Tarvitas mõned korrad nädalas		Tarvitas mõned korrad nädalas			
	n	%	n	%	n	%
Vanus						
16–24	9	8,0	12	7,7	21	7,8
25–34	40	20,9	27	9,5	67	14,1
35–44	57	29,2	21	7,9	78	17,0
45–54	58	31,0	42	14,8	100	21,2
55–64	51	24,3	25	7,7	76	14,2
Haridus						
Alg- või põhi-	16	14,0	3	3,4	19	9,4
Kesk-	56	24,4	22	8,0	78	15,5
Kesk-keri-	56	20,1	32	9,2	88	14,0
Kõrg-	87	31,8	70	11,6	157	17,9
Elukoht						
Tallinn	61	23,2	57	13,0	118	16,8
Muu linn	70	22,4	37	7,6	107	13,4
Maapiirkond	84	26,3	33	8,4	117	16,4
Elupiirkond						
Põhja-Eesti	95	25,5	75	12,5	170	17,5
Lääne-Eesti	26	26,0	14	9,3	40	15,9
Kesk-Eesti	29	26,4	8	6,8	37	16,2
Kirde-Eesti	11	13,3	6	5,2	17	8,6
Lõuna-Eesti	54	23,5	24	7,3	78	13,9
Rahvus						
Eestlane	186	27,9	111	10,9	297	17,7
Mitte-eestlane	29	12,6	16	5,4	45	8,5
Majanduslik aktiivsus						
Töötav	179	25,8	103	10,8	282	17,1
Mittetöötav	23	14,7	14	4,8	37	8,1
Töötu	13	25,0	10	15,9	23	20,0
Kuusissetulek pereliikme kohta						
<450 eurot	39	19,1	16	5,4	55	10,9
451–1000 eurot	98	23,2	67	9,9	165	14,9
≥1001 eurot	78	29,3	44	13,5	122	20,6

Tabel 35. Viimasel 12 kuul korraga vähemalt kuue alkoholiühiku tarvitamise sagedus soo ja vanuse järgi, %

	Mehed					Kokku	Naised					Kokku	
	Vanuserühm						Vanuserühm						
	16–24	25–34	35–44	45–54	55–64		16–24	25–34	35–44	45–54	55–64		
Mitte korragi	44,3	25,7	35,4	32,6	36,7	34,2	58,3	58,6	72,8	72,9	76,6	69,0	54,9
Harvem kui kord kuus	36,3	30,9	28,2	32,1	30,5	31,1	30,8	32,6	19,6	19,0	17,5	23,1	26,4
Kord kuus	15,0	23,6	21,5	18,7	21,0	20,4	9,0	6,7	5,3	5,6	3,7	5,7	11,7
Kord nädalas	4,4	18,9	11,8	10,2	10,0	11,6	1,3	1,8	2,3	2,1	1,9	1,9	5,8
Iga päev või peaaegu iga päev	0,0	1,1	3,1	6,4	1,9	2,7	0,6	0,4	0,0	0,4	0,3	0,3	1,3
Kokku (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	117	194	197	188	212	908	159	287	267	284	329	1326	2234
Vastamata (arv)	4	3	2	1	2	12	3	2	2	0	4	11	23

Tabel 36. Viimasel 12 kuul vähemalt kord kuus korraga kuut või enam alkoholiühikut tarvitanud vastajate jaotus soo, vanuse ja taustaandmete järgi

	Mehed		Naised		Kokku	
	On proovinud		On proovinud		Kokku	
	n	%	n	%	n	%
Vanus						
16–24	22	19,5	17	10,9	39	14,5
25–34	83	43,5	25	8,8	108	22,7
35–44	71	36,4	20	7,6	91	19,8
45–54	66	35,3	23	8,1	89	18,9
55–64	69	32,9	19	5,9	88	16,5
Haridus						
Alg- või põhi-	33	29,0	10	11,4	43	21,3
Kesk-	83	36,1	20	7,3	103	20,4
Keskeri-	101	36,3	35	10,3	136	21,7
Kõrg-	94	34,3	39	6,5	133	15,2
Elukoht						
Tallinn	83	31,6	38	8,7	121	17,2
Muu linn	123	39,3	33	6,8	156	19,6
Maapiirkond	105	32,8	33	8,4	138	19,4
Elupiirkond						
Põhja-Eesti	121	32,4	49	8,2	170	17,5
Lääne-Eesti	43	43,0	17	11,3	60	23,9
Kesk-Eesti	37	33,6	8	6,8	45	19,7
Kirde-Eesti	29	34,9	8	7,0	37	18,7
Lõuna-Eesti	81	35,2	22	6,7	103	18,4
Rahvus						
Eestlane	237	35,6	80	7,9	317	18,9
Mitte-eestlane	74	32,2	24	8,0	98	18,5
Majanduslik aktiivsus						
Töötav	251	36,2	76	7,9	327	19,8
Mittetöötav	42	27,3	16	5,5	57	12,9
Töötu	18	34,6	12	19,1	30	26,1
Kuusissetulek pereliikme kohta						
<450 eurot	75	36,8	24	8,0	99	19,7
451–1000 eurot	128	30,4	50	7,4	178	16,1
≥1001 eurot	108	40,6	30	9,2	138	23,3

Tabel 37. Ravimite mittemeditsiiniline tarvitamine elu jooksul soo ja vanuse järgi, %

	Mehed					Kokku	Naised					Kokku	
	Vanuserühm						Vanuserühm						
	16–24	25–34	35–44	45–54	55–64		16–24	25–34	35–44	45–54	55–64		
Ei	90,9	91,5	89,2	89,8	84,1	88,8	89,5	87,3	87,1	81,6	79,0	84,2	86,1
Jah	9,1	8,5	10,8	10,2	15,9	11,2	10,5	12,7	12,9	18,4	21,0	15,8	13,9
Kokku (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	117	194	197	188	212	908	159	287	267	284	329	1326	2234
Vastamata (arv)	7	6	2	2	5	22	6	4	4	1	5	20	42

Tabel 38. Elu jooksul ravimeid mittemeditsiinilisel otstarbel tarvitanud vastajate jaotus soo ja taustandmete järgi

	Mehed		Naised		Kokku	
	On tarvitanud		On tarvitanud			
	n	%	n	%	n	%
Haridus						
Alg- või põhi-	14	12,6	9	10,5	23	11,7
Kesk-	24	10,6	39	14,2	63	12,6
Keskeri-	34	12,2	61	17,7	95	15,3
Kõrg-	27	10,0	97	16,2	124	14,3
Elukoht						
Tallinn	29	11,0	58	13,4	87	12,5
Muu linn	39	12,8	82	16,9	121	15,3
Maapiirkond	31	9,8	66	17,0	97	13,8
Elupiirkond						
Põhja-Eesti	41	11,1	87	14,6	128	13,3
Lääne-Eesti	11	11,1	24	15,8	35	13,9
Kesk-Eesti	11	10,5	14	12,1	25	11,3
Kirde-Eesti	14	16,9	26	22,4	40	20,1
Lõuna-Eesti	22	9,7	55	16,8	77	13,9
Rahvus						
Eestlane	65	9,9	154	15,3	219	13,2
Mitte-eestlane	34	14,7	52	17,4	86	16,2
Majanduslik aktiivsus						
Töötav	75	10,9	155	16,3	230	14,0
Mittetöötav	19	12,8	35	11,7	54	12,1
Töötu	5	10,2	16	25,4	21	18,8
Kuusissetulek pereliikme kohta						
<450 eurot	33	14,9	51	17,1	84	16,2
451–1000 eurot	41	10,3	105	16,0	146	13,8
≥1001 eurot	25	9,6	50	15,6	75	12,9

Tabel 39. Ravimite mittemeditsiiniline tarvitamine viimase 12 kuu jooksul soo ja vanuse järgi, %

	Mehed					Kokku	Naised					Kokku	
	Vanuserühm						Vanuserühm						
	16–24	25–34	35–44	45–54	55–64		16–24	25–34	35–44	45–54	55–64		
Ei	98,2	98,9	98,0	99,5	97,1	98,3	97,4	97,2	97,0	95,1	96,3	96,5	97,2
Jah	1,8	1,1	2,0	0,5	2,9	1,7	2,6	2,8	3,0	4,9	3,7	3,5	2,8
Kokku (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	117	194	197	188	212	908	159	287	267	284	329	1326	2234
Vastamata (arv)	7	6	2	2	5	22	6	4	4	1	3	18	40

Tabel 40. Inhalantide (sh liim, lahustid, bensiin, naerugaas, välgumihkli gaas) tarvitamine elu jooksul soo ja vanuse järgi, %

	Mehed					Kokku	Naised					Kokku	
	Vanuserühm						Vanuserühm						
	16–24	25–34	35–44	45–54	55–64		16–24	25–34	35–44	45–54	55–64		
Ei	96,3	92,6	92,7	91,4	99,5	94,4	94,8	95,7	95,0	99,6	99,7	97,3	96,1
Jah	3,7	7,5	7,3	8,6	0,5	5,6	5,2	4,3	5,0	0,4	0,3	2,7	3,9
Kokku (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	117	194	197	188	212	908	159	287	267	284	329	1326	2234
Vastamata (arv)	8	6	5	2	8	29	6	7	5	2	8	28	57

Tabel 41. Elu jooksul inhalante (sh liim, lahustid, bensiin, naerugaas, välgumihkli gaas) tarvitanud vastajate jaotus soo ja taustaandmete järgi

	Mehed		Naised		Kokku	
	On tarvitanud		On tarvitanud			
	n	%	n	%	n	%
Haridus						
Alg- või põhi-	7	6,4	1	1,2	8	4,1
Kesk-	12	5,3	10	3,7	22	4,4
Keskeri-	14	5,1	7	2,0	21	3,4
Kõrg-	16	5,9	17	2,9	33	3,8
Elukoht						
Tallinn	15	5,8	14	3,2	29	4,2
Muu linn	22	7,2	12	2,5	34	4,3
Maapiirkond	12	3,8	9	2,3	21	3,0
Elupiirkond						
Põhja-Eesti	19	5,2	18	3,0	37	3,9
Lääne-Eesti	6	6,1	2	1,3	8	3,2
Kesk-Eesti	3	2,9	1	0,9	4	1,8
Kirde-Eesti	8	9,6	3	2,7	11	5,6
Lõuna-Eesti	13	5,8	11	3,4	24	4,4
Rahvus						
Eestlane	32	4,9	27	2,7	59	3,6
Mitte-eestlane	17	7,5	8	2,7	25	4,8
Majanduslik aktiivsus						
Töötav	41	6,0	22	2,3	63	3,9
Mittetöötav	5	3,4	11	3,8	16	3,7
Töötu	3	6,0	1	1,6	4	3,5
Kuusissetulek pereliikme kohta						
<450 eurot	11	5,5	7	2,4	18	3,6
451–1000 eurot	17	4,0	17	2,6	34	3,1
≥1001 eurot	21	8,1	11	3,4	32	5,5

Tabel 42. Uute psühhoaktiivsete ainete tarvitamine elu jooksul soo ja vanuse järgi, %

	Mehed					Kokku	Naised					Kokku	
	Vanuserühm						Vanuserühm						
	16–24	25–34	35–44	45–54	55–64		16–24	25–34	35–44	45–54	55–64		
Ei	94,6	92,0	97,4	96,2	98,1	95,8	92,2	96,5	97,3	97,5	98,8	96,9	96,5
Jah	1,8	3,7	0,5	1,1	0,5	1,5	0,0	2,1	0,4	0,0	0,6	0,7	1,0
Ei tea	3,6	4,3	2,1	2,7	1,4	2,7	7,8	1,4	2,3	2,5	0,6	2,4	2,5
Kokku (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	117	194	197	188	212	908	159	287	267	284	329	1326	2234
Vastamata (arv)	7	6	3	2	4	22	6	5	5	1	3	20	42

Tabel 43. Elu jooksul uusi psühhoaktiivseid aineid tarvitavate jaotus soo ja taustaandmete järgi

	Mehed		Naised		Kokku	
	On tarvitanud		On tarvitanud			
	n	%	n	%	n	%
Haridus						
Alg- või põhi-	3	2,7	0	0,0	3	1,5
Kesk-	6	2,6	2	0,7	8	1,6
Keskeri-	2	0,7	1	0,3	3	0,5
Kõrg-	2	0,7	6	1,0	8	0,9
Elukoht						
Tallinn	2	0,8	5	1,2	7	1,0
Muu linn	6	1,9	2	0,4	8	1,0
Maapiirkond	5	1,6	2	0,5	7	1,0
Elupiirkond						
Põhja-Eesti	6	1,6	8	1,3	14	1,5
Lääne-Eesti	1	1,0	0	0,0	1	0,4
Kesk-Eesti	1	0,9	0	0,0	1	0,5
Kirde-Eesti	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Lõuna-Eesti	5	2,2	1	0,3	6	1,1
Rahvus						
Eestlane	11	1,7	7	0,7	18	1,1
Mitte-eestlane	2	0,9	2	0,7	4	0,8
Majanduslik aktiivsus						
Töötav	11	1,6	7	0,7	18	1,1
Mittetöötav	2	1,4	2	0,7	4	0,9
Töötu	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Kuusissetulek pereliikme kohta						
<450 eurot	4	2,0	2	0,7	6	1,2
451–1000 eurot	4	1,0	4	0,6	8	0,8
≥1001 eurot	5	1,9	3	0,9	8	1,4

Tabel 44. Erinevate uimastite samaaegne tarvitamine elu jooksul soo ja vanuse järgi, %

	Mehed					Kokku	Naised					Kokku	
	Vanuserühm						Vanuserühm						
	16–24	25–34	35–44	45–54	55–64		16–24	25–34	35–44	45–54	55–64		
Mitte kunagi	75,2	63,8	77,8	92,5	94,6	81,5	70,4	76,7	85,1	95,4	96,6	86,7	84,6
Jah, varem	13,8	23,4	17,5	4,8	2,9	12,3	17,8	15,4	11,1	2,1	1,9	8,6	10,1
Jah, viimase 12 kuu jooksul	11,0	12,8	4,6	2,7	2,5	6,2	11,8	7,9	3,8	2,5	1,6	4,8	5,4
Kokku (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	117	194	197	188	212	908	159	287	267	284	329	1326	2234
Vastamata (arv)	8	6	3	2	8	27	7	8	5	1	7	28	55

Tabel 45. Elu jooksul erinevaid uimasteid samaaegselt tarvitanud vastajad soo, vanuse ja taustaandmete järgi

	Mehed		Naised		Kokku	
	On tarvitanud		On tarvitanud			
	n	%	n	%	n	%
Vanus						
16–24	27	24,8	45	29,6	72	27,6
25–34	68	36,2	65	23,3	133	28,5
35–44	43	22,2	39	14,9	82	18,0
45–54	14	7,5	13	4,6	27	5,8
55–64	11	5,4	11	3,4	22	4,2
Haridus						
Alg- või põhi-	21	19,1	11	12,8	32	16,3
Kesk-	51	22,6	47	17,3	98	19,7
Keskeri-	41	14,9	33	9,6	74	12,0
Kõrg-	50	18,5	82	13,8	132	15,3
Elukoht						
Tallinn	56	21,5	71	16,4	127	18,4
Muu linn	54	17,7	55	11,5	109	13,9
Maapiirkond	53	16,8	47	12,1	100	14,2
Elupiirkond						
Põhja-Eesti	82	22,3	93	15,7	175	18,2
Lääne-Eesti	15	15,2	19	12,8	34	13,7
Kesk-Eesti	15	14,0	10	8,7	25	11,3
Kirde-Eesti	12	14,8	9	7,8	21	10,7
Lõuna-Eesti	39	17,3	42	12,9	81	14,7
Rahvus						
Eestlane	125	19,1	153	15,2	278	16,8
Mitte-eestlane	38	16,7	20	6,8	58	11,2
Majanduslik aktiivsus						
Töötav	134	19,6	114	12,1	248	15,2
Mittetöötav	18	12,2	46	15,6	64	14,5
Töötu	11	22,5	13	20,6	24	21,4
Kuusissetulek pereliikme kohta						
<450 eurot	21	10,5	33	11,2	54	10,9
451–1000 eurot	65	16,4	87	13,2	152	14,4
≥1001 eurot	77	29,7	53	16,5	130	22,4

Tabel 46. Vastajate jaotus tervise enesehinnangu, soo ja vanuse järgi, %

	Mehed					Kokku	Naised					Kokku	
	Vanuserühm						Vanuserühm						
	16–24	25–34	35–44	45–54	55–64		16–24	25–34	35–44	45–54	55–64		
Väga hea/üsna hea	81,1	66,5	64,4	51,1	34,8	57,2	77,0	81,6	66,5	60,1	42,3	63,5	61,0
Keskmine	17,1	31,4	30,9	41,9	48,3	35,7	21,1	16,3	30,8	35,0	45,3	31,1	32,9
Üsna halb/väga halb	1,8	2,1	4,6	7,0	16,9	7,1	2,0	2,1	2,7	5,0	12,5	5,4	6,1
Kokku (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	117	194	197	188	212	908	159	287	267	284	329	1326	2234
Vastamata (arv)	6	6	3	2	5	22	7	5	4	1	0	17	39

Tabel 47. Halva ja üsna halva tervise enesehinnanguga vastajate jaotus soo, vanuse ja taustaandmete järgi

	Mehed		Naised		Kokku	
	Halb tervis		Halb tervis			
	n	%	n	%	n	%
Vanus						
16–24	2	1,8	3	2,0	5	1,9
25–34	4	2,1	6	2,1	10	2,1
35–44	9	4,6	7	2,7	16	3,5
45–54	13	7,0	14	5,0	27	5,8
55–64	35	16,9	41	12,5	76	14,2
Haridus						
Alg- või põhi-	8	7,2	5	5,8	13	6,6
Kesk-	18	7,9	26	9,1	44	8,6
Keskeri-	28	10,0	31	8,9	59	9,4
Kõrg-	9	3,4	9	1,5	18	2,1
Elukoht						
Tallinn	11	4,2	15	3,5	26	3,7
Muu linn	29	9,5	30	6,2	59	7,4
Maapiirkond	23	7,3	26	6,7	49	7,0
Elupiirkond						
Põhja-Eesti	17	4,6	21	3,5	38	3,9
Lääne-Eesti	8	8,2	10	6,5	18	7,2
Kesk-Eesti	10	9,3	10	8,6	20	8,9
Kirde-Eesti	7	8,4	9	7,7	16	8,0
Lõuna-Eesti	21	9,3	21	6,4	42	7,6
Rahvus						
Eestlane	42	34,2	47	4,7	89	5,4
Mitte-eestlane	21	39,8	24	8,0	45	8,5
Majanduslik aktiivsus						
Töötav	32	4,7	39	4,1	71	4,3
Mittetöötav	22	14,8	23	7,6	45	10,0
Töötu	9	18,0	9	14,3	18	15,9
Kuusissetulek pereliikme kohta						
<450 eurot	32	15,8	38	12,7	70	13,9
451–1000 eurot	23	5,0	30	4,4	53	4,6
≥1001 eurot	8	3,1	3	0,9	11	1,9

Tabel 48. Terviseprobleemide esinemine alkoholi tarvitamise tõttu soo ja vanuse järgi, %

	Mehed						Naised						Kokku
	Vanuserühm					Kokku	Vanuserühm					Kokku	
	16–24	25–34	35–44	45–54	55–64		16–24	25–34	35–44	45–54	55–64		
Ma ei tarvita alkoholi	24,6	10,8	13,5	7,0	18,0	14,0	17,1	13,5	16,9	18,7	31,8	20,2	17,7
Jah, viimase 12 kuu jooksul	5,5	5,9	11,5	8,7	7,5	8,0	5,3	3,6	3,1	1,4	0,9	2,6	4,8
Jah, aga mitte viimase 12 kuu jooksul	7,3	14,0	13,5	19,5	15,0	14,4	7,2	8,5	4,2	8,5	6,0	6,9	9,9
Mitte kunagi	62,7	69,4	61,5	64,9	59,5	63,6	70,4	74,5	75,8	71,4	61,3	70,4	67,6
Kokku (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	117	194	197	188	212	908	159	287	267	284	329	1326	2234
Vastamata (arv)	7	8	5	3	12	35	7	5	7	1	11	31	66

Tabel 49. Terviseprobleemide esinemine narkootikumide tarvitamise tõttu soo ja vanuse järgi, %

	Mehed						Naised						Kokku
	Vanuserühm					Kokku	Vanuserühm					Kokku	
	16–24	25–34	35–44	45–54	55–64		16–24	25–34	35–44	45–54	55–64		
Ma ei tarvita narkootikume	61,8	52,7	66,3	75,7	76,3	67,0	63,8	67,7	72,2	71,4	80,3	72,0	70,0
Jah, viimase 12 kuu jooksul	0,0	2,2	0,5	0,6	0,0	0,7	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,1	0,3
Jah, aga mitte viimase 12 kuu jooksul	2,7	4,8	3,2	0,0	0,0	2,1	1,3	1,4	0,8	0,4	0,0	0,7	1,3
Mitte kunagi	35,5	40,3	30,0	23,7	23,7	30,2	34,9	30,9	26,6	28,3	19,7	27,2	28,4
Kokku (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	117	194	197	188	212	908	159	287	267	284	329	1326	2234
Vastamata (arv)	7	8	7	11	18	51	7	5	8	1	14	35	86

Tabel 50. Terviseprobleemide esinemine rahustite, uinute või valuvaigistite tarvitamise tõttu soo ja vanuse järgi, %

	Mehed						Naised						Kokku
	Vanuserühm					Kokku	Vanuserühm					Kokku	
	16–24	25–34	35–44	45–54	55–64		16–24	25–34	35–44	45–54	55–64		
Ma ei tarvita rahusteid/uinuteid	71,6	56,5	59,5	66,1	60,5	62,0	52,6	54,3	52,1	48,2	45,9	50,3	54,9
Jah, viimase 12 kuu jooksul	0,0	0,0	0,5	1,1	0,5	0,5	2,0	1,8	2,3	0,7	2,8	1,9	1,4
Jah, aga mitte viimase 12 kuu jooksul	2,8	0,5	3,2	2,8	0,0	1,8	2,6	1,8	2,3	2,5	4,4	2,8	2,4
Mitte kunagi	25,7	43,0	36,8	29,9	39,0	35,8	42,8	42,2	43,2	48,6	46,9	45,0	41,4
Kokku (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	117	194	197	188	212	908	159	287	267	284	329	1326	2234
Vastamata (arv)	8	8	7	11	17	51	7	5	8	0	11	31	82

Tabel 51. Terviseprobleemide esinemine dopingainete tarvitamise tõttu soo ja vanuse järgi, %

	Mehed						Naised						Kokku
	Vanuserühm					Kokku	Vanuserühm					Kokku	
	16–24	25–34	35–44	45–54	55–64		16–24	25–34	35–44	45–54	55–64		
Ma ei tarvita dopingaineid	84,6	67,2	74,2	77,4	78,8	75,7	75,0	77,7	77,1	73,1	78,9	76,5	76,2
Jah, viimase 12 kuu jooksul	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Jah, aga mitte viimase 12 kuu jooksul	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,1	0,1
Mitte kunagi	15,5	32,8	25,8	22,0	21,2	24,2	25,0	22,3	22,9	27,0	20,8	23,4	23,7
Kokku (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	117	194	197	188	212	908	159	287	267	284	329	1326	2234
Vastamata (arv)	7	8	7	11	19	52	7	5	9	2	16	39	91

Tabel 52. Alkoholi liigtarvitamise tõttu ravi saanud inimesed soo ja vanuse järgi, %

	Mehed						Kokku	Naised					Kokku	
	Vanuserühm					Kokku		Vanuserühm						Kokku
	16–24	25–34	35–44	45–54	55–64			16–24	25–34	35–44	45–54	55–64		
Ei	99,1	97,9	94,4	91,9	95,2	95,4	99,3	100,0	99,6	100,0	98,5	99,5	97,8	
Jah, varem	0,0	1,6	5,1	7,0	4,8	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,3	1,8	
Jah, viimasel 12 kuul	0,9	0,5	0,5	1,1	0,0	0,6	0,7	0,0	0,4	0,0	0,3	0,2	0,4	
Kokku (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
Kokku (arv)	117	194	197	188	212	908	159	287	267	284	329	1326	2234	
Vastamata (arv)	7	8	2	2	4	23	7	5	5	0	3	20	43	

Tabel 53. Narkootikumide tarvitamise tõttu ravi saanud inimesed soo ja vanuse järgi, %

	Mehed						Kokku	Naised					Kokku	
	Vanuserühm					Kokku		Vanuserühm						Kokku
	16–24	25–34	35–44	45–54	55–64			16–24	25–34	35–44	45–54	55–64		
Ei	100,0	99,5	99,0	98,4	99,5	99,2	100,0	100,0	99,2	100,0	100,0	99,9	99,6	
Jah, varem	0,0	0,5	1,0	1,1	0,5	0,7	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,2	0,4	
Jah, viimasel 12 kuul	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	
Kokku (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
Kokku (arv)	117	194	197	188	212	908	159	287	267	284	329	1326	2234	
Vastamata (arv)	7	8	3	2	5	25	7	5	6	0	3	21	46	

Tabel 54. Tervisespordi harrastamine soo ja vanuse järgi, %

	Mehed					Kokku	Naised					Kokku	
	Vanuserühm						Vanuserühm						
	16–24	25–34	35–44	45–54	55–64		16–24	25–34	35–44	45–54	55–64		
Ei harrasta tervisesporti	17,1	27,6	26,3	36,6	45,9	32,2	20,0	19,2	25,6	25,3	31,0	24,8	27,8
Harvem kui kord nädalas	16,2	20,0	17,0	24,6	15,0	18,6	18,7	18,9	18,7	21,4	23,8	20,6	19,8
1–2 korda nädalas	25,2	23,8	34,0	24,6	20,3	25,6	28,7	32,7	27,5	32,7	26,3	29,6	28,0
3–4 korda nädalas	26,1	24,9	16,5	12,0	12,6	17,6	24,7	23,1	20,2	16,0	13,5	18,8	18,3
5–7 korda nädalas	14,4	3,2	5,2	2,2	5,3	5,3	6,7	5,0	7,3	4,6	5,3	5,7	5,5
8 ja enam korda nädalas	0,9	0,5	1,0	0,0	1,0	0,7	1,3	1,1	0,8	0,0	0,0	0,5	0,6
Kokku (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	117	194	197	188	212	908	159	287	267	284	329	1326	2234
Vastamata (arv)	6	9	3	5	5	28	9	6	5	3	10	33	61

Tabel 55. Depressiooni sümptomite (MHI-5 ≤ 52) esinemine soo ja vanuse järgi

	Mehed					Kokku	Naised					Kokku	
	Vanuserühm						Vanuserühm						
	16–24	25–34	35–44	45–54	55–64		16–24	25–34	35–44	45–54	55–64		
Ei ole probleeme	86,6	90,9	93,1	87,6	90,2	90,0	78,7	83,5	87,5	88,6	86,1	85,4	87,3
On probleeme	13,4	9,1	7,0	12,4	9,8	10,1	21,3	16,6	12,5	11,4	13,9	14,6	12,8
Kokku (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	117	194	197	188	212	908	159	287	267	284	329	1326	2234
Vastamata (arv)	5	8	10	11	38	72	4	9	11	13	55	92	164

Tabel 56. Uimastite tarvitamine on Eestis probleemiks, vastajate jaotus soo ja vanuse järgi, %

	Mehed					Kokku	Naised					Kokku	
	Vanuserühm						Vanuserühm						
	16–24	25–34	35–44	45–54	55–64		16–24	25–34	35–44	45–54	55–64		
Üldse mitte	5,5	4,8	4,6	4,8	5,3	5,0	3,3	1,4	1,5	1,1	2,2	1,8	3,1
Väike probleem	22,0	13,4	8,2	4,3	2,4	8,8	14,9	6,4	2,3	1,1	1,3	4,2	6,0
Mõõdukas probleem	45,9	43,9	33,2	32,3	27,9	35,6	46,1	40,6	29,7	32,3	20,1	32,2	33,6
Suur probleem	26,6	38,0	54,1	58,6	64,4	50,7	35,7	51,6	66,5	65,6	76,5	61,9	57,4
Kokku (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	117	194	197	188	212	908	159	287	267	284	329	1326	2234
Vastamata (arv)	8	7	1	2	4	22	5	6	4	2	10	27	49

Tabel 57. Uimastite tarvitamine on probleemiks minu elukohas, vastajate jaotus soo ja vanuse järgi, %

	Mehed					Kokku	Naised					Kokku	
	Vanuserühm						Vanuserühm						
	16–24	25–34	35–44	45–54	55–64		16–24	25–34	35–44	45–54	55–64		
Üldse mitte	38,2	34,1	32,1	31,5	36,1	34,1	30,3	18,5	14,6	22,3	21,4	20,6	26,1
Väike probleem	30,9	27,0	30,5	29,8	20,6	27,5	27,6	34,9	29,5	29,4	29,6	30,5	29,3
Mõõdukas probleem	20,0		25,4	24,2	20,2	23,4	27,0	29,5	35,8	31,6	25,7	30,1	27,4
Suur probleem	10,9	13,5	13,2	18,5	17,8	15,1	15,1	17,1	20,1	16,7	23,2	18,8	17,3
Kokku (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	117	194	197	188	212	908	159	287	267	284	329	1326	2234
Vastamata (arv)	7	9	7	10	32	65	7	6	13	15	49	90	155

Tabel 58. Uimastite mõõdukas tarvitamine ei tekita probleeme, vastajate soo ja vanuse järgi, %

	Mehed					Kokku	Naised					Kokku	
	Vanuserühm						Vanuserühm						
	16–24	25–34	35–44	45–54	55–64		16–24	25–34	35–44	45–54	55–64		
Nõustun täielikult	8,2	4,3	3,6	1,6	0,5	3,2	5,3	2,5	0,4	1,4	2,2	2,1	2,5
Nõustun osaliselt	16,4	22,9	6,2	4,4	2,0	9,7	15,1	7,6	5,3	3,6	0,9	5,5	7,2
Raske öelda	19,1	17,0	15,0	12,6	12,4	14,8	15,1	8,3	9,5	8,5	11,6	10,2	12,1
Osaliselt ei nõustu	19,1	12,2	9,3	5,5	4,5	9,2	19,1	13,3	9,2	5,0	3,1	8,8	9,0
Ei nõustu üldse	37,3	43,6	66,0	76,0	80,7	63,1	45,4	68,4	75,6	81,6	82,1	73,4	69,2
Kokku (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	117	194	197	188	212	908	159	287	267	284	329	1326	2234
Vastamata (arv)	7	6	3	5	10	31	7	9	5	2	11	34	65

Tabel 59. Hirm sattuda vägivalda ohvriks teiste inimeste uimastitarvitamise tõttu, vastajate jaotus soo ja vanuse järgi, %

	Mehed					Kokku	Naised					Kokku	
	Vanuserühm						Vanuserühm						
	16–24	25–34	35–44	45–54	55–64		16–24	25–34	35–44	45–54	55–64		
Jah	22,5	26,1	31,8	43,0	38,1	33,2	40,5	48,8	53,8	47,4	48,2	48,4	42,2
Ei	59,5	48,4	36,9	22,0	25,4	36,4	28,8	24,2	16,0	13,4	14,7	18,4	25,7
Ei oska öelda	18,0	25,5	31,3	35,0	36,6	30,4	30,7	27,1	30,2	39,2	37,1	33,3	32,1
Kokku (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	117	194	197	188	212	908	159	287	267	284	329	1326	2234
Vastamata (arv)	6	6	2	2	7	23	6	6	5	1	3	21	44

Tabel 60. Hinnang, kas alkohol või narkootilised ained on ohuks ühiskonnale, vastajate jaotus soo ja vanuse järgi, %

	Mehed					Kokku	Naised					Kokku	
	Vanuserühm						Vanuserühm						
	16–24	25–34	35–44	45–54	55–64		16–24	25–34	35–44	45–54	55–64		
Alkohol oluliselt rohkem	36,0	28,7	19,3	15,2	9,7	20,3	22,2	16,4	16,4	10,3	9,3	14,0	16,5
Alkohol veidi rohkem	25,2	14,4	10,4	10,3	9,2	12,8	28,8	21,1	14,9	10,6	5,3	14,5	13,8
Mõlemad võrdselt	20,7	36,7	41,2	37,5	38,8	36,3	33,3	43,9	47,3	56,0	59,0	49,7	44,3
Narkootikumid veidi rohkem	9,0												
Narkootikumid oluliselt rohkem	9,0	11,2	9,9	9,8	8,7	9,8	7,2	10,4	8,0	8,2	8,3	8,5	9,0
Kokku (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	117	194	197	188	212	908	159	287	267	284	329	1326	2234
Vastamata (arv)	6	6	5	4	6	27	6	7	5	2	5	25	52

Tabel 61. Uimastite tarvitamisega seotud riskid, vastajate jaotus soo ja vanuse järgi, %

	Mehed					Kokku	Naised					Kokku	
	Vanuserühm						Vanuserühm						
	16–24	25–34	35–44	45–54	55–64		16–24	25–34	35–44	45–54	55–64		
<i>Suitsetab ühe või mitu pakki sigarette päevas</i>													
Riski pole	2,7	1,6	1,6	0,6	2,0	1,6	2,0	0,4	0,4	0,0	0,6	0,5	1,0
Väike risk	9,9	10,2	7,3	3,9	5,9	7,2	5,2	4,6	1,9	1,1	1,6	2,6	4,5
Mõõdukas risk	35,1	32,6	28,7	33,5	29,3	31,5	28,6	21,5	23,6	21,4	20,8	22,6	26,2
Suur risk	52,3	55,6	62,5	62,1	62,9	59,8	64,3	73,6	74,1	77,5	77,0	74,3	68,4
<i>Joob end purju vähemalt korra nädalas</i>													
Riski pole	3,6	1,6	1,0	0,6	2,5	1,7	2,0	1,4	0,0	0,7	0,3	0,8	1,2
Väike risk	19,8	18,3	10,9	9,3	3,9	11,7	9,1	6,7	5,0	2,5	3,5	5,0	7,7
Mõõdukas risk	42,3	44,6	43,2	48,6	34,5	42,5	44,8	37,1	29,4	29,4	28,2	32,6	36,6
Suur risk	34,2	35,5	44,8	41,5	59,1	44,1	44,2	54,8	65,7	67,4	68,0	61,7	54,6
<i>Proovib kanepit korra või kaks</i>													
Riski pole	34,2	22,0	10,9	7,1	1,5	13,3	16,9	14,4	5,7	3,2	1,9	7,5	9,9
Väike risk	39,6	42,5	24,5	23,6	15,4	28,0	40,3	37,7	23,3	14,8	12,2	24,0	25,6
Mõõdukas risk	13,5	18,8	30,2	35,2	30,9	26,8	25,3	22,9	33,2	34,5	35,3	30,8	29,2
Suur risk	12,6	16,7	34,4	34,1	52,2	31,9	17,5	25,0	37,8	47,5	50,6	37,8	35,4
<i>Suitsetab kanepit regulaarselt</i>													
Riski pole	8,1	2,2	1,6	0,6	1,0	2,2	2,6	1,8	0,0	0,0	0,0	0,7	1,3
Väike risk	21,6	19,9	8,3	5,0	1,5	10,2	9,7	10,6	6,2	0,7	0,6	5,0	7,1
Mõõdukas risk	36,0	31,7	22,4	18,9	12,0	23,0	35,7	22,2	15,4	11,5	8,6	16,8	19,3
Suur risk	34,2	46,2	67,7	75,6	85,5	64,6	52,0	65,5	78,5	87,8	90,7	77,4	72,2
<i>Proovib ecstasy't korra või kaks</i>													
Riski pole	6,4	4,3	3,1	2,2	1,5	3,2	3,9	3,2	1,2	0,4	0,3	1,6	2,2
Väike risk	21,8	18,4	12,0	7,2	5,1	12,0	16,9	15,9	8,9	5,8	4,5	9,6	10,6
Mõõdukas risk	29,1	30,8	23,6	28,7	23,2	26,8	35,1	28,2	24,2	22,3	22,2	25,5	26,0
Suur risk	42,7	46,5	61,3	61,9	70,2	57,9	44,2	52,8	65,8	71,6	73,0	63,3	61,2
<i>Tarvitab ecstasy't regulaarselt</i>													
Riski pole	1,8	0,0	0,0	0,0	0,5	0,4	0,7	0,4	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2
Väike risk	2,7	2,7	1,6	0,6	0,5	1,5	1,3	1,1	0,4	0,4	0,3	0,6	1,0
Mõõdukas risk	7,3	13,0	7,3	3,9	4,5	7,2	6,5	4,2	1,9	2,2	1,6	3,0	4,6
Suur risk	88,2	84,3	91,1	95,6	94,5	91,0	91,6	94,4	97,7	97,5	98,1	96,3	94,2
<i>Proovib amfetamiini korra või kaks</i>													
Riski pole	4,6	3,2	1,1	0,6	0,5	1,7	2,6	2,1	0,8	0,4	0,0	1,0	1,3
Väike risk	10,0	12,4	11,5	6,1	3,6	8,6	12,3	9,2	7,7	3,6	2,9	6,5	7,4
Mõõdukas risk	34,6	23,8	19,9	22,8	21,8	23,6	27,3	22,5	20,4	18,0	17,5	20,5	21,8
Suur risk	50,9	60,5	67,5	70,6	74,1	66,1	57,8	66,2	71,2	78,1	79,6	72,0	69,6
<i>Tarvitab amfetamiini regulaarselt</i>													
Riski pole	1,8	0,5	0,0	0,6	0,5	0,6	0,7	0,4	0,0	0,0	0,0	0,2	0,3
Väike risk	0,0	1,6	0,5	0,0	0,0	0,5	0,7	0,7	0,4	0,0	0,0	0,3	0,4
Mõõdukas risk	5,5	7,5	6,3	2,2	3,1	4,9	3,3	1,4	0,4	1,1	1,3	1,3	2,7
Suur risk	92,7	90,3	93,2	97,2	96,5	94,1	95,5	97,5	99,2	98,9	98,7	98,2	96,6
<i>Proovib fentanüüli korra või kaks</i>													
Riski pole	1,8	0,5	0,5	0,0	0,5	0,6	0,7	0,7	0,0	0,0	0,0	0,2	0,4
Väike risk	4,6	3,8	2,7	4,5	2,0	3,4	7,1	4,2	3,5	2,5	2,0	3,5	3,5
Mõõdukas risk	23,6	12,4	10,1	17,9	16,3	15,4	24,7	16,6	13,9	13,8	13,4	15,6	15,5
Suur risk	70,0	83,2	86,8	77,7	81,1	80,7	67,5	78,5	82,7	83,7	84,6	80,6	80,6
<i>Tarvitab fentanüüli regulaarselt</i>													
Riski pole	1,8	0,0	0,0	0,6	0,5	0,5	0,7	0,4	0,0	0,0	0,0	0,2	0,3
Väike risk	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,1	0,7	0,0	0,4	0,0	0,0	0,2	0,1
Mõõdukas risk	6,4	2,7	1,6	2,2	2,5	2,8	0,7	0,4	0,0	0,0	1,0	0,4	1,4
Suur risk	91,8	97,3	97,9	97,2	97,0	96,6	98,0	99,3	99,6	100,0	99,0	99,3	98,2
<i>Proovib anaboolseid steroide korra või kaks</i>													
Riski pole	3,6	0,5	2,7	1,1	1,5	1,7	3,3	2,2	0,4	0,4	0,3	1,1	1,4
Väike risk	19,1	11,8	9,5	9,5	7,7	10,8	13,1	17,6	10,1	6,5	5,3	10,2	10,4
Mõõdukas risk	44,6	32,8	29,6	34,6	31,6	33,7	41,2	26,9	27,2	25,0	26,3	28,1	30,4
Suur risk	32,7	54,8	58,2	54,8	59,2	53,7	42,5	53,4	62,3	68,1	68,1	60,6	57,8
<i>Tarvitab anaboolseid steroide regulaarselt</i>													
Riski pole	2,7	0,0	0,0	0,6	0,5	0,6	0,7	0,4	0,0	0,4	0,0	0,2	0,4
Väike risk	1,8	2,7	2,1	0,0	0,0	1,3	3,3	0,4	0,4	0,4	0,3	0,7	0,9
Mõõdukas risk	20,0	12,9	13,7	8,8	11,7	12,8	15,0	11,1	5,1	5,4	5,2	7,7	9,8
Suur risk	75,5	84,4	84,2	90,7	87,8	85,3	81,1	88,2	94,5	93,8	94,4	91,4	88,9

Tabel 62. Eri narkootiliste ainete tarvitamise ja hankimisviiside eest karistamine, vastajate jaotus soo ja vanuse järgi, %

	Mehed					Kokku	Naised					Kokku		
	Vanuserühm						Kokku	Vanuserühm					Kokku	
	16-24	25-34	35-44	45-54	55-64			16-24	25-34	35-44	45-54	55-64		
<i>Kanepi tarvitamine</i>														
Pole vaja karistada	72,1	70,1	57,5	49,7	44,6	57,6	52,9	55,0	55,4	47,3	38,7	49,2	52,6	
Tuleks karistada	27,9	30,0	42,5	50,3	55,4	42,5	47,1	45,0	44,6	52,8	61,3	50,8	47,4	
Kokku (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
Kokku (arv)	117	194	197	188	212	908	159	287	267	284	329	1326	2234	
Vastamata (arv)	6	7	4	5	19	41	6	5	9	11	16	47	88	
<i>Alkoholi ja retseptiravimite segatarvitamine</i>														
Pole vaja karistada	53,2	66,3	66,5	68,0	61,5	63,9	59,1	63,0	62,9	60,6	49,0	58,6	60,8	
Tuleks karistada	46,9	33,7	33,5	32,0	38,5	36,1	40,9	37,0	37,1	39,4	51,0	41,4	39,2	
Kokku (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
Kokku (arv)	117	194	197	188	212	908	159	287	267	284	329	1326	2234	
Vastamata (arv)	6	7	6	7	17	43	5	6	8	15	19	53	96	
<i>Retseptiravimite ostmine tänavalt/turul</i>														
Pole vaja karistada	30,6	23,5	37,8	43,1	40,0	35,4	22,2	24,1	29,8	38,5	33,3	30,4	32,4	
Tuleks karistada	69,4	76,5	62,2	56,9	60,0	64,6	77,8	75,9	70,2	61,5	66,7	69,6	67,6	
Kokku (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
Kokku (arv)	117	194	197	188	212	908	159	287	267	284	329	1326	2234	
Vastamata (arv)	6	7	4	7	17	41	6	5	9	11	17	48	89	
<i>Kanepitaimede kasvatamine</i>														
Pole vaja karistada	51,4	53,5	37,8	33,3	20,7	38,1	39,9	38,3	28,8	28,8	24,3	31,1	33,9	
Tuleks karistada	48,7	46,5	62,2	66,7	79,3	61,9	60,1	61,7	71,2	71,2	75,7	68,9	66,1	
Kokku (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
Kokku (arv)	117	194	197	188	212	908	159	287	267	284	329	1326	2234	
Vastamata (arv)	6	7	4	5	14	36	6	5	10	10	16	47	83	
<i>Uimastavat ainet sisaldavate seente korjamine</i>														
Pole vaja karistada	42,3	56,2	50,8	52,2	42,4	49,3	40,3	48,4	46,1	43,0	35,7	42,7	45,4	
Tuleks karistada	57,7	43,9	49,2	47,8	57,7	50,8	59,7	51,6	53,9	57,0	64,3	57,3	54,6	
Kokku (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
Kokku (arv)	117	194	197	188	212	908	159	287	267	284	329	1326	2234	
Vastamata (arv)	6	7	6	6	16	41	5	4	9	12	18	48	89	

Tabel 63. Kanepi ostmise seaduslikult lubamine, vastajate jaotus soo ja vanuse järgi, %

	Mehed						Naised						Kokku
	Vanuserühm					Kokku	Vanuserühm					Kokku	
	16–24	25–34	35–44	45–54	55–64		16–24	25–34	35–44	45–54	55–64		
Ei, mitte ühelgi eesmärgil	10,8	13,9	23,2	27,3	33,3	22,9	14,3	23,3	27,1	24,6	30,7	25,1	24,2
Jah, mistahes eesmärgil	45,1	36,4	17,0	9,1	3,4	19,8	22,7	14,1	7,6	5,0	2,2	8,9	13,3
Jah, ainult ravi eesmärgil	44,1	49,7	59,8	63,6	63,3	57,3	63,0	62,5	65,3	70,5	67,1	66,0	62,5
Kokku (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	117	194	197	188	212	908	159	287	267	284	329	1326	2234
Vastamata (arv)	6	7	3	1	5	22	5	4	5	3	10	27	49

Tabel 64. Kanepi tarvitamise seaduslikult lubamine, vastajate jaotus soo ja vanuse järgi, %

	Mehed						Naised						Kokku
	Vanuserühm					Kokku	Vanuserühm					Kokku	
	16–24	25–34	35–44	45–54	55–64		16–24	25–34	35–44	45–54	55–64		
Nõustun täielikult	20,2	18,1	6,2	5,5	1,5	9,3	10,5	7,5	3,1	1,4	2,8	4,5	6,4
Nõustun osaliselt	36,7	38,8	29,9	20,3	10,8	26,3	33,3	27,6	24,6	21,0	13,2	22,7	24,1
Raske öelda	13,8	11,7	11,9	12,6	18,7	13,8	13,7	14,7	13,5	15,3	15,4	14,6	14,3
Osaliselt ei nõustu	8,3	11,2	11,3	11,5	8,4	10,3	15,7	13,3	11,9	16,7	8,5	12,9	11,8
Ei nõustu üldse	21,1	20,2	40,7	50,0	60,6	40,4	26,8	36,9	46,9	45,6	60,2	45,4	43,4
Kokku (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	117	194	197	188	212	908	159	287	267	284	329	1326	2234
Vastamata (arv)	8	6	3	6	9	32	6	8	7	3	10	34	66

Tabel 65. Erinevate teabeallikate olulisus narkootiliste ainete kohta soo ja vanuse järgi, %

	Mehed					Kokku	Naised					Kokku	
	Vanuserühm						Vanuserühm						
	16–24	25–34	35–44	45–54	55–64		16–24	25–34	35–44	45–54	55–64		
<i>Sotsiaal- ja tervishoiutöötajad</i>													
Üldse mitte	27,6	39,5	24,9	29,6	26,0	29,7	26,5	20,5	16,8	20,1	14,1	18,9	23,3
Teatud määral oluline	54,3	35,1	40,0	33,5	42,0	39,8	39,7	45,7	38,7	36,4	33,9	38,8	39,2
Väga oluline	18,1	25,4	35,1	36,9	32,0	30,5	33,8	33,8	44,5	43,6	51,9	42,3	37,6
<i>Politsei</i>													
Üldse mitte	30,5	37,8	24,3	27,1	30,9	30,1	25,0	17,7	14,6	18,5	15,6	17,7	22,7
Teatud määral oluline	47,6	39,5	40,0	35,6	37,6	39,4	38,8	43,0	38,7	37,0	34,0	38,2	38,7
Väga oluline	21,9	22,7	35,7	37,3	31,5	30,5	36,2	39,4	46,6	44,5	50,4	44,1	38,6
<i>Kool</i>													
Üldse mitte	25,7	28,7	17,2	28,8	32,6	26,6	18,4	13,3	10,6	14,6	17,0	14,5	19,4
Teatud määral oluline	42,9	29,7	28,5	20,3	22,5	27,6	27,0	24,5	20,4	24,3	17,0	22,2	24,3
Väga oluline	31,4	41,6	54,3	50,9	44,9	45,9	54,6	62,2	69,0	61,2	66,1	63,4	56,3
<i>Ajakirjandus, TV, raadio</i>													
Üldse mitte	26,7	25,0	12,3	20,1	16,9	19,6	14,5	9,7	4,3	8,3	7,8	8,4	12,9
Teatud määral oluline	54,3	44,6	42,8	37,4	37,6	42,3	50,0	41,4	35,2	36,8	29,9	37,5	39,4
Väga oluline	19,1	30,4	44,9	42,5	45,5	38,2	35,5	48,9	60,6	54,9	62,2	54,1	47,7
<i>Internet</i>													
Üldse mitte	10,6	18,0	13,0	19,7	22,7	17,3	9,8	5,7	5,1	8,7	13,0	8,4	12,0
Teatud määral oluline	36,5	35,0	34,6	33,7	38,6	35,6	25,5	28,3	28,9	35,5	33,8	30,9	32,8
Väga oluline	52,9	47,0	52,4	46,6	38,6	47,1	64,7	66,0	66,0	55,9	53,2	60,8	55,3
<i>Sotsiaalmeedia</i>													
Üldse mitte	31,7	31,0	26,0	31,8	30,1	29,9	18,4	15,5	13,5	16,5	17,3	16,1	21,7
Teatud määral oluline	41,4	38,0	36,2	33,0	39,8	37,3	38,8	36,1	34,5	40,0	37,5	37,3	37,3
Väga oluline	26,9	31,0	37,8	35,2	30,1	32,7	42,8	48,4	52,0	43,5	45,2	46,7	41,0
<i>Sõbrad ja tuttavad</i>													
Üldse mitte	19,2	20,1	20,2	29,0	29,7	24,0	17,8	16,9	13,4	15,1	23,0	17,3	20,0
Teatud määral oluline	46,2	43,5	42,6	39,2	46,3	43,3	44,1	38,9	44,9	51,0	38,7	43,3	43,3
Väga oluline	34,6	36,4	37,2	31,8	24,0	32,7	38,2	44,2	41,7	34,0	38,3	39,4	36,7
<i>Uimastite tarvitajad</i>													
Üldse mitte	33,7	38,6	41,4	50,6	60,7	45,8	37,5	37,4	31,7	41,9	41,4	38,1	41,2
Teatud määral oluline	50,0	41,9	40,3	29,6	21,4	35,6	34,9	35,3	39,8	33,7	34,2	35,6	35,6
Väga oluline	16,4	19,6	18,2	19,9	17,9	18,6	27,6	27,3	28,5	24,4	24,4	26,4	23,2
<i>Kodu, perekond</i>													
Üldse mitte	31,7	30,3	23,0	29,9	28,8	28,5	20,9	16,9	14,8	19,5	18,0	17,8	22,1
Teatud määral oluline	37,5	30,3	24,6	21,5	30,5	28,1	31,4	31,3	28,1	34,7	21,9	29,3	28,8
Väga oluline	30,8	39,5	52,5	48,6	40,7	43,5	47,7	51,8	57,0	45,8	60,1	53,0	49,2